

Actueel WG van het middel Thiovit Jet, 5395 N

24 december 2020

Wettelijk gebruiksvoorschrift voor professioneel gebruik

W.8

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe		Echte meeldauw ¹	5 kg/ha**	5 kg/ha	2 per teeltcyclus	10 kg/ha per teeltcyclus	10	-
Zomertarwe		Echte meeldauw ¹	5 kg/ha**	5 kg/ha	2 per teeltcyclus	10 kg/ha per teeltcyclus	10	-
Appel (onbedekte teelt)	voor de bloei of	Schurft ² Echte meeldauw ³	0,5% (500 g/100L water)	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	15 kg/ha per 12 maanden	10	-
	tijdens en na de bloei		0,4% (400 g/100L water)	4,0 kg/ha	5 per 12 maanden	25 kg/ha per 12 maanden	10	

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
			0,25% (250 g/100L water)	3,75 kg/ha	6 per 12 maanden		7	
			0,25% (250 g/100L water)	2,5 kg/ha	10 per 12 maanden		7	
Peer (onbedekte teelt)	voor de bloei of	Schurft ⁴ Echte meeldauw ³	0,5% (500 g/100L water)	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	15 kg/ha per 12 maanden	10	-
	tijdens en na de bloei		0,4% (400 g/100L water)	4,0 kg/ha	5 per 12 maanden	25 kg/ha per 12 maanden	10	
			0,25% (250 g/100L water)	3,75 kg/ha	6 per 12 maanden		7	
			0,25% (250 g/100L water)	2,5 kg/ha	10 per 12 maanden		7	
Kers (onbedekte teelt)	na de bloei	Hagelschotziekte ⁵ Echte meeldauw ⁶	0,5% (500 g/100L water)	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	15 kg/ha per 12 maanden	14	-
Pruim (onbedekte teelt)	voor de bloei	Hagelschotziekte ⁵ Echte meeldauw ⁶	0,5% (500 g/100L water)	7,5 kg/ha	1 per 12 maanden	13,5 kg/ha per 12 maanden	14	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
	na de bloei		0,4% (400 g/100L water)	6 kg/ha	1 per 12 maanden			
Perzik (bedekte teelt)	voor de bloei	Hagelschotziekte ⁵ Echte meeldauw ⁶	0,5% (500 g/100L water)	7,5 kg/ha	1 per 12 maanden	13,5 kg/ha per 12 maanden	14	-
	na de bloei		0,4% (400 g/100L water)	6 kg/ha	1 per 12 maanden			-
Aardbei (bedekte teelt)		Echte meeldauw ⁹	0,4% (400 g/100L water)	4,8 kg/ha	4 per 12 maanden	19,2 kg/ha per 12 maanden	5	-
Aardbei (onbedekte teelt)		Echte meeldauw ⁹	0,4% (400 g/100L water)	4,8 kg/ha	3 per 12 maanden	14,4 kg/ha per 12 maanden	5	-
Bessen (onbedekte teelt)		Echte meeldauw ⁷	0,4% (400 g/100L water)	4,8 kg/ha	3 per 12 maanden	14,4 kg/ha per 12 maanden	7	-
Tafeldruif (onbedekte teelt)		Echte meeldauw ⁸	0,5% (500 g/100L water)	7 kg/ha	2 per 12 maanden	14 kg/ha per 12 maanden	7	-
Wijndruif (onbedekte teelt)		Echte meeldauw ⁸	0,5% (500 g/100L water)	7 kg/ha	2 per 12 maanden	14 kg/ha per 12 maanden	7	42

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Schorseneer (onbedekte teelt)		Echte meeldauw ¹⁰	0,5% (500 g/100L water)	4 kg/ha	2 per 12 maanden	8 kg/ha per 12 maanden	7	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)		Echte meeldauw ¹¹	0,05-0,1% (50- 100 g/100L water)	1 kg/ha	10 per 12 maanden	10 kg/ha per 12 maanden	10	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)		Echte meeldauw ¹¹	0,4% (400 g/100L water)	4,8 kg/ha	3 per 12 maanden	14,4 kg/ha per 12 maanden	10	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)		Echte meeldauw ¹¹	0,4% (400 g/100L water)	4 kg/ha	10 per 12 maanden	40 kg/ha per 12 maanden	10	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)		Echte meeldauw ¹¹	0,4% (400 g/100L water)	4 kg/ha	5 per 12 maanden	20 kg/ha per 12 maanden	10	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** 0,1 L/ha uitvloeier toevoegen

¹ Echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)

² Schurft (*Venturia inaequalis*)

³ Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

⁴ Schurft (*Venturia pirina*)

⁵ Hagelschotziekte (*Stigmia carpophila*)

⁶ Echte meeldauw (*Sphaeroteca pannosa*)

⁷ Echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)

⁸ Echte meeldauw (*Uncinula necator*)

⁹ Echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

¹⁰ Echte meeldauw (*Erysiphe cichoracearum*)

¹¹ Echte meeldauw (*Erysiphaceae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van wintertarwe en zomertarwe het middel toepassen vanaf begin aarzwelling (BBCH 41) tot einde aarvorming (voor de bloei) (BBCH59).

In de onbedekte teelt van appel, peer, pruim, bessen, tafeldruif, wijndruif, aardbei, schorseneer, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten het middel toepassen tot en met juli.

In de onbedekte teelt van kers het middel toepassen tot en met mei.

In de teelt van aardbei en bessen het middel niet tijdens de oogst toepassen.

In de teelt van appel, peer en pruim het middel toepassen in 1000 tot 1500 L water/ha.

In de teelt van bessen het middel toepassen in 1000 tot 1200 L water/ha.

In de teelt van druiven het middel toepassen in 1000 tot 1400 L water/ha.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

Zomer- en wintertarwe

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5;
- een techniek uit de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van minimaal 175 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Appel en Peer

Voor 1 mei

- een techniek uit tenminste de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter;
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter, en een beperking van de dosering tot maximaal 2,5 kg/ha per bespuiting.

Vanaf 1 mei

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5;
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter;
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een beperking van de dosering tot maximaal 2,5 kg/ha per bespuiting.

Pruim en kers

Voor 1 mei

- een techniek uit tenminste de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter.

Vanaf 1 mei

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5;
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter.

Bessen en Druiven

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5;
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter.

Schorseneer en onbedekte teelt van aardbei

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5;
- een techniek uit de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens.

Onbedekte teelt van bloemisterijgewassen:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5;
- een techniek uit de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van minimaal 125 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Vaste planten teelt

- een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens.

Boomkwekerijgewassen (neerwaarts bespoten)

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5;
- een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij/bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens.

Hoge laanbomen

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 500 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot/de perceelgrens.

Opzetters en spillen

- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 500 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot/de perceelgrens.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Zwavel kan gewasschade geven op appels en peren. Het gebruik van spuitzwavel bij zwavelgevoelige rassen wordt afgeraden. Wees in verband met kans op schade voorzichtig met bespuitingen in en direct na de bloei. Verlaag de dosering bij hoge temperaturen.

Na half juni geen spuitzwavel meer toepassen op Gloëosporium-gevoelige percelen.