

BELOUKHA
15316
26-08-26

WG-format 2.2 - professioneel gebruik

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel, loofdoodmiddel en middel voor de behandeling van wortelopslag/uitlopers voor het professionele gebruik door middel van een bespuiting in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardappelen	Doodspuiten	Aardappelloof	16 L/ha	16 L/ha	2	5
	Voor opkomst, voor poten/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha		7
Bieten	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Granen	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Mais	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Droog te oogsten erwten m.u.v. suikererwt	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Droog te oogsten bonen	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Oliehoudende zaden m.u.v. karwij	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Hennep	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Voedergewassen m.u.v. hanekam en esparcette	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Witlof (pennenteelt)	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Cichorei	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Boekweit	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Miscanthus	Voor opkomst	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Quinoa	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Sorghum	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Gierst	Voor opkomst, voor zaaien/planten	Melganzevoet ¹	16 L/ha	16 L/ha	2	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Melganzervoet (*Chenopodium album*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Blad- en mergkool	Na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Bladraap	Na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Aardbei (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha op zwartstrook	10 L/ha	2	14
	Pleksgewijs bespuiten	Uitlopers	16 L/ha	1,6 L/ha		14
Bladgroenten m.u.v. tuinmelde, zeeaster en kiemgroenten (onbedekte teelt)	Voor opkomst, voor zaaien/planten, na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Peulgroenten (onbedekte teelt)	Voor opkomst, voor zaaien/planten, na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Vruchtgroenten (onbedekte teelt)	Voor opkomst, voor zaaien/planten, na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Koolgewassen (onbedekte teelt)	Voor opkomst, voor zaaien/planten, na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen, suikerwortel, Japanse aardappel en yam (onbedekte teelt)	Voor opkomst, voor zaaien/planten, na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)	Voor opkomst, voor zaaien/planten, na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Stengelgroenten m.u.v. zeekraal (onbedekte teelt)	Voor opkomst, voor zaaien/planten, na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Suikermaïs (onbedekte teelt)	Voor opkomst, voor zaaien/planten, na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7
Kruiden (vers en gedroogd) (onbedekte teelt)	Voor opkomst, voor zaaien/planten, na opkomst tussen de gewasrijen ³	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ²	16 L/ha	16 L/ha	2	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

² Straatgras (*Poa annua*)

³ Toepassing met gebruikmaking van afschermkappen om het gewas niet te raken

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel voor de loofdoding in aardappel toepassen in 200-250 liter water per ha.

Het middel als behandeling tegen onkruid en uitlopers toepassen in 200-400 liter water per ha.

Continu roeren tijdens het prepareren en toepassen van de formulering.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, is toepassing in de teelt van alle gebruiken uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, is toepassing in de teelt van akkerbouwgewassen niet toegestaan vanaf 1 september tot 1 januari.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor van nature voorkomende of uitgezette natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling. Indien u natuurlijke vijanden heeft uitgezet: raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel.

Let op: Het middel werkt niet selectief en kan dus planten en struiken die met het middel in contact komen rechtstreeks of na overwaaien, ernstig beschadigen of doden. Werk nauwkeurig, behandel alleen die planten die bestreden moeten worden.

Let op: Voor een goede loofdoding het middel toepassen op geklapt gewas of toepassen vanaf het moment dat de meeste bladeren geel zijn (BBCH 93). Bij gewassen met een sterke groeikracht of een sterke loofontwikkeling is het raadzaam om het gewas eerst 'open' te spuiten met een daarvoor toegelaten loofdoodmiddel.