

25 maart 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 of 24 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 of 24 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Aardappelen	gewasbehandeling - vanaf begin stengelstrekking (BBCH 31)	Bladluis ⁴⁰ Kevers ⁴¹	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	7
Suikerbiet	gewasbehandeling	Bladluis ⁴⁰	0,25 L/ha	0,25 L/ha	1 per 12 maanden	0,25 L/ha per 12 maanden	-	-
Hop	gewasbehandeling	Bladluis ¹	0,75 L/ha	0,75 L/ha	1 per 24 maanden	0,75 L/ha per 24 maanden	-	21
Appel	gewasbehandeling - tot volle bloei,	Bladluis ^{2, 3, 4, 5}	0,04% (40 ml/ 100L)	0,4 L/ha of	1 per 12 maanden	0,9 L/ha	-	-

	of	Bladluis ^{2, 3, 4, 5} Appelbladvlo ⁶		0,6 L/ha	1 per 24 maanden	per 24 maanden		
	gewasbehandeling - vanaf volle bloei	Bladluis ^{2, 4, 5, 7, 8} Appelbladvlo ⁶ Appelzaagwesp ⁹ Toortswants ¹⁰	0,06% (60 ml/ 100L)	0,9 L/ha	1 per 24 maanden			14
Peer	gewasbehandeling - tot volle bloei, of	Bladluis ^{3, 11, 12}	0,04% (40 ml/ 100L)	0,4 L/ha	1 per 12 maanden	0,9 L/ha per 24 maanden	-	-
		Bladluis ^{3, 11, 12, 13} Perenbladvlo ^{14, 15}	0,06% (60 ml/ 100L)	0,9 L/ha	1 per 24 maanden			
	gewasbehandeling - vanaf volle bloei	Bladluis ^{7, 8, 11, 13}						14
Aardbei (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Wittevlieg ^{16, 17}	0,0625 % (62,5 ml/100 L)	0,625 L/ha	2 per 12 maanden	1,25 L/ha per 12 maanden	10	3
		Bladluis ^{18, 19, 20, 21}	0,05 % (50 ml/100 L)	0,5 L/ha				
Aardbei (grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf begin vorming uitloper	Wittevlieg ^{16, 17}	0,0625 % (62,5 ml/100 L)	0,625 L/ha	1 per 12 maanden	0,625 L/ha per 12 maanden	-	3
		Bladluis ^{18, 19, 20, 21}	0,05 % (50 ml/100 L)	0,5 L/ha				
Druif (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf bloeiwijzen volledig ontwikkeld of	Cicaden ²²	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	14

	gewasbehandeling - vanaf begin bloei	Druivencicade ²³	0,24 L/ha	0,24 L/ha				
Sla; <i>Lactuca</i> spp. (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf 2- bladstadium tot kropvorming of ontwikkeling oogstbare gedeelte of	Bladluis ^{18, 26, 27, 28, 29, 30}	0,625 L/ha	0,625 L/ha	1 per 24 maanden	0,625 L/ha per 24 maanden	-	3
	gewasbehandeling - vanaf kropvorming of ontwikkeling oogstbare gedeelte		0,625 L/ha (in minimaal 500 L water per ha)		1 per 12 maanden	0,625 L/ha per 12 maanden		
Courgette (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Wittevlieg ^{16, 17} Bladluis ²⁵	0,075% (75 ml/ 100L)	1,12 L/ha	2 per 12 maanden	2,24 L/ha per 12 maanden	10	3
		Bladluis ^{18, 27}	0,06% (60 ml/ 100L)	0,9 L/ha				
Komkommer (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Wittevlieg ^{16, 17} Bladluis ²⁵	0,075% (75 ml/ 100L)	1,12 L/ha	2 per 12 maanden	2,24 L/ha per 12 maanden	10	3
		Bladluis ^{18, 27}	0,06% (60 ml/ 100L)	0,9 L/ha				
Watermeloen (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Wittevlieg ^{16, 17} Bladluis ²⁵	0,075% (75 ml/ 100L)	0,56 L/ha	2 per 12 maanden	1,12 L/ha per 12 maanden	10	3
		Bladluis ^{18, 27}	0,06% (60 ml/ 100L)	0,45 L/ha				

Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> m.u.v. paprika (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Wittevlieg ^{16, 17} Bladluis ²⁵	0,075% (75 ml/100L)	1,12 L/ha	2 per 12 maanden	2,24 L/ha per 12 maanden	10	3
		Bladluis ^{18, 27}	0,06% (60 ml/ 100L)	0,9 L/ha				
Paprika (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Wittevlieg ¹⁶ Bladluis ²⁵	0,075% (75 ml/100L)	0,9 L/ha	1 per 12 maanden	0,9 L/ha	-	3
		Bladluis ^{18, 27}	0,06% (60 ml/ 100L)					
Wortelen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ⁴⁴	0,25 L/ha	0,25 L/ha	1 per 12 maanden	0,25 L/ha per 12 maanden	-	21
Tulp (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf begin bloei	Bladluis ^{25, 31}	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Zantedeschia (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf begin bloei	Bladluis ^{25, 31}	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Hyacinth (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf begin bloei	Bladluis ^{25, 31}	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Narcis, fijnbollig (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf begin bloei	Bladluis ^{25, 31}	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Lelie (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf begin bloei	Bladluis ^{25, 31}	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-

Bloembol-en bloemknolgewassen (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ³¹	0,05% (50 ml/100L)	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	10	-
Bloembol-en bloemknolgewassen (grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf begin bloei	Bladluis ³¹	0,05% (50 ml/100L)	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Bloemisterijgewassen (niet grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 25, 27, 31, 32, 33, 34	0,5 L/ha	0,5 L/ha	4 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	7	-
Bloemisterijgewassen (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 20, 27, 28, 31, 32, 33	0,05% (50 ml/100L)	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	10	
Boomkwekerijgewassen (niet grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 27, 31, 32, 33, 34	0,5 L/ha	0,5 L/ha	4 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 20, 27, 31, 32, 33, 34	0,05 % (50 ml/100L)	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	7	-
Vaste plantenteelt (niet grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 25, 27, 31, 32, 33, 34	0,5 L/ha	0,5 L/ha	4 per 12 maanden	2 L/ha per 12 maanden	7	-
Vaste plantenteelt (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 20, 27, 28, 31, 32, 33	0,05 % (50 ml/100L)	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

1. Hopluis (*Phorodon humuli*)
2. Roze appelluis (*Dysaphis plantaginea*)
3. Appelgrasluis (*Rhopalosiphum insertum*)
4. Bloedvlekkenluis (*Dysaphis devector*)
5. Fluitekruidluis (*Dysaphis anthrisci*)
6. Appelbladvlo (*Psylla mali*)
7. Groene appeltakluis (*Aphis pomi*)
8. Groene citrusluis (*Aphis spiraecola*)
9. Appelzaagwesp (*Hoplocampa testudinea*)
10. Toortswants (*Campylomma verbasci*)
11. Roze perenluis (*Dysaphis pyri*)
12. Vouwgalluis (*Anuraphis farfarae*)
13. Zwarte perenluis (*Melanaphis pyrarum*)
14. Perenbladvlo (*Psylla pyri*)
15. Kleine perenbladvlo (*Psylla pyricola*)
16. Kaswittevlies (*Trialeurodes vaporariorum*)
17. Tabakswittevlies (*Bemisia tabaci*)
18. Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*)
19. Aardbeiknotshaarluis (*Chaetosiphon fragaefolii*)
20. Gewone rozenluis (*Macrosiphum rosae*)
21. Kleine aardbeiluis (*Aphis forbesi*)
22. Cicaden (*Auchenorrhyncha* spp.)
23. Druivencicade (*Empoasca vitis*)
24. Kleine frambozenluis (*Aphis idaei*)
25. Katoenluis (*Aphis gossypii*)
26. Groene slaluis (*Nasanovia ribisnigri*)
27. Groene perzikluis (*Myzus persicae*)
28. Boterbloemluis (*Aulacorthum solani*)
29. Bruine slaluis (*Uroleucon sonchi*)
30. Slaluis (*Acyrtosiphon lactucae*)
31. Zwarte bonenluis (*Aphis fabae*)
32. Sjalottenluis (*Myzus ascalonicus*)

33. Groene kortstaartluis (*Brachycaudus helichrysi*)
34. Beukenbladluis (*Phyllaphis fagi*)
35. Braamgrasluis (*Sitobion fragariae*)
36. Appelbladcicade (*Edwardsiana crataegi*)
37. Groene rietcicade (*Cicadella viridis*)
38. Groene appelwants (*Lygus pabulinus*)
39. Appelbloesemkever (*Anthonomus pomorum*)
40. Bladluizen (*Aphids* spp.)
41. Coloradokever (*Leptinotarsa decemlineata*)
42. Erwtbladluis (*Acyrtosiphon pisum*)
43. Melige koolluis (*Brevicoryne brassicae*)
44. Zevenbladluis (*Cavariella aegopodii*)
45. Zwarte kersenbladluis (*Myzus cerasi*)
46. Kersenvlieg (*Rhagoletis cerasi* (L.))
47. Pruimenbladluis (*Hyalopterus pruni*)
48. Zaagwesp (*Hoplocampa* sp.)
49. Bladwesp (*Eurytoma amygdali*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er zijn voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 of 24 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 of 24 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Voederbiet	gewasbehandeling	Bladluis ⁴⁰	0,25 L/ha	0,25 L/ha	1 per 12 maanden	0,25 L/ha per 12 maanden	-	-
Droog te oogsten erwten	gewasbehandeling - vanaf 2 tot 9-bladstadium (BBCH 12-19) <i>of</i>	Bladluis ⁴²	0,375 L/ha	0,375 L/ha	1 per 24 maanden	0,375 L/ha per 24 maanden	-	-
	gewasbehandeling - vanaf begin stengelstrekking (BBCH 30)				1 per 12 maanden	0,375 L/ha per 12 maanden	-	7
Droog te oogsten bonen m.u.v. sojaboon	gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zij scheuten zichtbaar (BBCH 21 – 29) <i>of</i>	Bladluis ⁴²	0,375 L/ha	0,375 L/ha	1 per 24 maanden	0,375 L/ha per 24 maanden	-	-

	gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)				1 per 12 maanden	0,375 L/ha per 12 maanden	-	7
Veldboon (groenbemester)	gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zijscheuten zichtbaar (BBCH 21- 29) <i>of</i>	Bladluis ⁴²	0,375 L/ha	0,375 L/ha	1 per 24 maanden	0,375 L/ha per 24 maanden	-	-
	gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)				1 per 12 maanden	0,375 L/ha per 12 maanden	-	7
Veldboon voor silage	gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zijscheuten zichtbaar (BBCH 21- 29) <i>of</i>	Bladluis ⁴²	0,375 L/ha	0,375 L/ha	1 per 24 maanden	0,375 L/ha per 24 maanden	-	-
	gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)				1 per 12 maanden	0,375 L/ha per 12 maanden	-	7
Cichorei	gewasbehandeling	Bladluis ⁴⁰	0,25 L/ha	0,25 L/ha	1 per 12 maanden	0,25 L/ha per 12 maanden	-	-
Pitvruchten m.u.v. appel en peer	gewasbehandeling - tot volle bloei, <i>of</i>	Bladluis ^{2, 3, 4, 5} Cicaden ^{36, 37}	0,04% (40 ml/ 100L)	0,4 L/ha <i>of</i>	1 per 12 maanden	0,9 L/ha per 24 maanden	-	-

		Bladluis ^{2, 3, 4, 5} Appelbladvlo ⁶ Cicaden ^{36, 37} Groene Appelwants ³⁸ Appelbloesem kever ³⁹		0,6 L/ha	1 per 24 maanden			14
	gewasbehandeling - vanaf volle bloei	Bladluis ^{2, 4, 5, 7, 8} Appelbladvlo ⁶ Appelzaagwesp ⁹ Toortswants ¹⁰ Cicaden ^{36, 37} Groene appelwants ³⁸ Appelbloesem kever ³⁹	0,06% (60 ml/ 100L)	0,9 L/ha	1 per 24 maanden			
Kers (onbedekte teelt)	gewasbehandeling na de bloei	Bladluis ⁴⁵	0,375 L/ha	0,375 L/ha	1 per 12 maanden	0,9 L/ha per 24 maanden	-	7
		Kersenvlieg ⁴⁶	0,9 L/ha	0,9 L/ha	1 per 24 maanden		-	7
Pruim (onbedekte teelt)	gewasbehandeling na de bloei	Bladluis ^{33, 47}	0,375 L/ha	0,375 L/ha	1 per 12 maanden	0,9 L/ha per 24 maanden	-	14
		Bladwesp ^{48, 49}	0,9 L/ha	0,9 L/ha	1 per 24 maanden		-	14

Bessen m.u.v kiwibes (onbedekte teelt en walk- in tunnels)	gewasbehandeling	Bladluis ⁴⁰	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	3
Braam (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ^{24, 25, 35}	0,06% (60 ml/ 100L)	0,6 L/ha	2 per 12 maanden	1,2 L/ha per 12 maanden	10	3
Framboos (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ^{24, 25}	0,06% (60 ml/ 100L)	0,6 L/ha	2 per 12 maanden	1,2 L/ha per 12 maanden	10	3
Braam-en framboosachtigen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ⁴⁰	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	3
Boon met peul incl. edamame (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zij scheuten zichtbaar (BBCH 21- 29) <i>of</i>	Bladluis ⁴²	0,375 L/ha	0,375 L/ha	1 per 24 maanden	0,375 L/ha per 24 maanden	-	-
	gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)				1 per 12 maanden	0,375 L/ha per 12 maanden		7
Boon zonder peul incl. edamame (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf eerste tot 9 of meer zij scheuten zichtbaar (BBCH 21- 29) <i>of</i>	Bladluis ⁴²	0,375 L/ha	0,375 L/ha	1 per 24 maanden	0,375 L/ha per 24 maanden	-	-

	gewasbehandeling - vanaf eerste bloemknoppen zichtbaar (BBCH 51)				1 per 12 maanden	0,375 L/ha per 12 maanden		3
Erwt met peul (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf 2 tot 9- bladstadium (BBCH 12- 19) <i>of</i>	Bladluis ⁴²	0,375 L/ha	0,375 L/ha	1 per 24 manden	0,375 L/ha per 24 aanden	-	-
	gewasbehandeling - vanaf begin stengelstrekking (BBCH30)				1 per 12 maanden	0,375 L/ha per 12 maanden	-	7
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf 2 tot 9- bladstadium (BBCH 12-19) <i>of</i>	Bladluis ⁴²	0,375 L/ha	0,375 L/ha	1 per 24 maanden	0,375 L/ha per 24 maanden	-	-
	gewasbehandeling - vanaf begin stengelstrekking (BBCH 30)				1 per 12 maanden	0,375 L/ha per 12 maanden	-	3
Koolgewassen m.u.v. Chinese kool (onbedekte teelt)	gewasbehandeling - vanaf 2- bladstadium tot ontwikkeling oogstbare gedeelte (BBCH 12-39) <i>of</i>	Bladluis ^{27, 43}	0,625 L/ha	0,625 L/ha	1 per 24 maanden	0,625 L/ha per 24 maanden	-	-

	gewasbehandeling - vanaf ontwikkeling oogstbare gedeelte (BBCH 40)		0,625 L/ha (in minimaal 500 L water per ha)		1 per 12 maanden	0,625 L/ha per 12 maanden	-	3
Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen, zoete aardappel en yam (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ⁴⁴	0,25 L/ha	0,25 L/ha	1 per 12 maanden	0,25 L/ha per 12 maanden	-	21
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. tulp, zantedeschia, hyacinth, fijnbollig, narcis, lelie (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ^{25, 31}	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Bloemisterijgewassen (grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ^{18, 25, 27, 31, 32, 33, 34}	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Bloemisterijgewassen (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Wittevlieg ¹⁶	0,075 % (75 ml/100L)	0,75 L/ha	1 per 12 maand en	0,75 L/ha per 12 maanden	-	-
Snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ^{18, 20, 27, 28,31, 32,.33}	0,05% (50 ml/100L)	0,75 L/ha <i>of</i>	1 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	-	-
				0,5 L/ha	2 per 12 maanden		10	

Trekheesters (grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 20, 27, 28,31, 32, 33	0,05% (50 ml/100L)	0,75 L/ha of	1 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	-	
				0,5 L/ha	2 per 12 maanden		10	
Snijgroen (grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 20, 27, 28,31, 32, 33	0,05% (50 ml/100L)	0,75 L/ha of	1 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	-	
				0,5 L/ha	2 per 12 maanden		10	
Laanbomen (grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 27, 31, 32, 33, 34 Cicaden ²²	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Klimplanten (grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 27, 31, 32, 33, 34 Cicaden ²²	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Coniferen en Kerstbomen (grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 27, 31, 32, 33, 34	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Sierheesters (incl. rozen) (grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 27, 31, 32, 33, 34 Cicaden ²²	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-

Bos- en haagplantsoen (grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 27, 31, 32, 33, 34 Cicaden ²²	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Vruchtbomen en –struiken (grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 27, 31, 32, 33, 34 Cicaden ^{36, 37} Groene appelwants ³⁸ Appelbloesem kever ³⁹	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Boomkwekerijgewassen (niet grondgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Wittevlieg ¹⁶	0,075 % (75 ml/ 100L)	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	1,5 L/ha Per 12 maanden	14	-
Vaste plantenteelt (grondgebonden onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis 18, 27, 31, 32, 33, 34 Cicaden ²²	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Vaste plantenteelt (niet gro ndgebonden bedekte teelt)	gewasbehandeling	Wittevlieg ¹⁶	0,075 % (75 ml/100L)	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	1,5 L/ha per 12 maanden	14	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

1. Hopluis (*Phorodon humuli*)
2. Roze appelluis (*Dysaphis plantaginea*)
3. Appelgrasluis (*Rhopalosiphum insertum*)
4. Bloedvlekkenluis (*Dysaphis devector*)
5. Fluitekruidluis (*Dysaphis anthrisci*)
6. Appelbladvlo (*Psylla mali*)

7. Groene appeltakluis (*Aphis pomi*)
8. Groene citrusluis (*Aphis spiraecola*)
9. Appelzaagwesp (*Hoplocampa testudinea*)
10. Toortswants (*Campylomma verbasci*)
11. Roze perenluis (*Dysaphis pyri*)
12. Vouwgalhuis (*Anuraphis farfarae*)
13. Zwarte perenluis (*Melanaphis pyrararia*)
14. Perenbladvlo (*Psylla pyri*)
15. Kleine perenbladvlo (*Psylla pyricola*)
16. Kaswittevlies (*Trialeurodes vaporariorum*)
17. Tabakswittevlies (*Bemisia tabaci*)
18. Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*)
19. Aardbeiknotshaarluis (*Chaetosiphon fragaefolii*)
20. Gewone rozenluis (*Macrosiphum rosae*)
21. Kleine aardbeiluis (*Aphis forbesi*)
22. Cicaden (*Auchenorrhyncha* spp.)
23. Druivencicade (*Empoasca vitis*)
24. Kleine frambozenluis (*Aphis idaei*)
25. Katoenluis (*Aphis gossypii*)
26. Groene slaluis (*Nasanovia ribisnigri*)
27. Groene perzikluis (*Myzus persicae*)
28. Boterbloemluis (*Aulacorthum solani*)
29. Bruine slaluis (*Uroleucon sonchi*)
30. Slaluis (*Acyrtosiphon lactucae*)
31. Zwarte bonenluis (*Aphis fabae*)
32. Sjalottenluis (*Myzus ascalonicus*)
33. Groene kortstaartluis (*Brachycaudus helichrysi*)
34. Beukenbladluis (*Phyllaphis fagi*)
35. Braamgrasluis (*Sitobion fragariae*)
36. Appelbladcicade (*Edwardsiana crataegi*)
37. Groene rietcicade (*Cicadella viridis*)
38. Groene appelwants (*Lygus pabulinus*)
39. Appelbloesemkever (*Anthonomus pomorum*)
40. Bladluizen (*Aphids* spp.)
41. Coloradokever (*Leptinotarsa decemlineata*)

42. Erwtbladluis (*Acyrtosiphon pisum*)
43. Melige koolluis (*Brevicoryne brassicae*)
44. Zevenbladluis (*Cavariella aegopodii*)
45. Zwarte kersenbladluis (*Myzus cerasi*)
46. Kersenvlieg (*Rhagoletis cerasi* (L.))
47. Pruimenbladluis (*Hyalopterus pruni*)
48. Zaagwesp (*Hoplocampa* sp.)
49. Bladwesp (*Eurytoma amygdali*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van peer uitsluitend toepassen met machinaal voortgetrokken apparatuur.

In de teelt van boomkwekerijgewassen (niet grondgebonden bedekte teelt) en vaste plantenteelt (niet grondgebonden bedekte teelt) het middel maximaal met 1,5 L/ha per 12 maanden toepassen.

In de teelt van bloemisterijgewassen (niet grondgebonden bedekte teelt) het middel tegen bladluis (2 x 0,5 L/ha) of tegen wittevlies (1 x 0,75 L/ha) toepassen.

In de teelt van aardappel het middel toepassen in 150-600 liter water per ha.

In de teelt van peulgroenten (boon met/zonder peul, erwt met/zonder peul) het middel toepassen in 200-750 liter water per ha.

In de teelt van suikerbiet, voederbiet en cichorei het middel toepassen vanaf het tweede bladstadium tot 9 of meerdere bladeren ontvouwd (BBCH 12-19).

Om het grondwater te beschermen mag dit middel in onbedekte teelten niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen niet worden gebruikt in de periode van 1 september tot 1 maart en wanneer minder dan 60% van het bodemoppervlak bedekt is.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, laanbomen, klimplanten, coniferen en kerstbomen, sierheesters (incl. rozen), bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken en vaste plantenteelt niet worden gebruikt wanneer

minder dan 60% van het bodemoppervlak bedekt is.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de grondgebonden bedekte teelt van snijbloemen, trekheesters, snijgroen niet worden gebruikt wanneer minder dan 70 % van het bodemoppervlak bedekt is.

Om de vogels te beschermen moet Sivanto Prime in sla en koolgewassen (onbedekte teelt) worden toegepast met minimaal 500 L water/ha, indien het wordt toegepast vanaf kropvorming of oogstbare gedeelte (BBCH 41 – 49 of BBCH 40-49 respectievelijk). De concentratie van de werkzame stof in de spuitvloeistof mag niet meer dan 0,025 kg a.s./hL zijn.

Om de bijen te beschermen mag u dit product niet gebruiken in tankmix met fungiciden uit de groep ergosterol-biosyntheseblokkers (FRAC code 3 fungicide) op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen die actief bezocht worden door bijen.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is toepassing in kers en pruim niet toegestaan na 31 juli.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is toepassing in bessen, braam- en framboosachtigen, wortelen en wortel- en knolgewassen niet toegestaan na 31 augustus.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van één van de volgende driftreducerende maatregelen:

Toepassingsgebied	Maximale dosering (middel) per toepassing	Driftreducerende maatregelen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater geldend op het hele perceel	Driftreducerende maatregelen op percelen die <u>niet</u> grenzen aan oppervlaktewater geldend op het hele perceel
Aardappelen	0,5 L/ha	Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens) of;	Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of;

		• Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5.
Hop	0,75 L/ha	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT99, of: • Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens).	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT99, of • Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).
Pitvruchten m.u.v. peer	0,4 L/ha Toepassing vóór 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT99.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT99.
	0,4 L/ha Toepassing vanaf 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT90.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

	0,6 L/ha Toepassing vóór 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT 99.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT99.
	0,6 L/ha Toepassing vanaf 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT90.
	0,9 L/ha Toepassing vóór 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens).	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens).
	0,9 L/ha Toepassing vanaf 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT95, of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens).	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT95, of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens).

Peer	0,4 L/ha Toepassing vóór 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT99.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT99.
	0,4 L/ha Toepassing vanaf 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT90.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT90.
	0,9 L/ha Toepassing vóór 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens).	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens).
	0,9 L/ha Toepassing vanaf 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT95, of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot /	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT95, of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens).

		perceelgrens).	
Kers en pruim (onbedekte teelt)	0,375 L/ha Toepassing vóór 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT99.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT99.
	0,375 L/ha Toepassing vanaf 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT95.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT95.
	0,9 L/ha Toepassing vóór 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens).	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens).
	0,9 L/ha Toepassing vanaf 1 mei	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of;	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of;

		• Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5.
Bessen (onbedekte teelt)	0,3 L/ha	• Een techniek uit tenminste de klasse Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens).	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).
Druif	0,5 L/ha	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens).	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Braam-en framboos-achtigen (onbedekte teelt)	0,3 L/ha	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelsgrens).	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan tot aan de perceelgrens), of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).
Koolgewassen	0,625 L/ha	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens) of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens) of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5.
Wortelen en wortel- en knolgewassen	0,25 L/ha	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5, of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens).	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5, of; • Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).

Bloembol-en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	0,5 L/ha	• Geen additionele maatregelen nodig.	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens).
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	0,5 L/ha	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • In geval van handmatige bespuiting (rugspuit/spuitlans) een afschermkap met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens).	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of; • In geval van handmatige bespuiting (rugspuit/spuitlans) een afschermkap.
Boomkwekerijgewassen (niet grondgebond en onbedekte teelt)	0,5 L/ha	• In geval van een <u>neerwaartse bespuiting</u> een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • In geval van handmatige neerwaartse bespuiting (rugspuit/spuitlans) een	• In geval van een <u>neerwaartse bespuiting</u> een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of; • In geval van handmatige neerwaartse bespuiting (rugspuit/spuitlans) een afschermkap, of;

		afschermkap met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • in geval van een <u>zij-/opwaartse bespuiting</u>: - <u>Hoge laanbomen</u>: een techniek uit tenminste klasse DRT95 - <u>Opzetters en spillen</u> een techniek uit tenminste klasse DRT90.	• In geval van een <u>zij-/opwaartse bespuiting</u>: - <u>Hoge laanbomen</u>: een techniek uit tenminste klasse DRT95 in combinatie met een totale teeltvrije zone van 500 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens). In deze teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas, waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten - <u>Opzetters en spillen</u>: een techniek uit tenminste klasse DRT90 in combinatie met een totale teeltvrije zone van 500 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens). In deze teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas, waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.
Laanbomen, Klimplanten, Coniferen en Kerstbomen, Sierheesters (incl. rozen), Bos- en haagplantsoen, Vruchtbomen en –struiken (grondgebonden)	0,5 L/ha	• In geval van een <u>neerwaartse bespuiting</u> een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of;	• In geval van een <u>neerwaartse bespuiting</u> een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of; • In geval van handmatige neerwaartse

onbedekte teelt)		• In geval van handmatige neerwaartse bespuiting (rugspuit/spuitlans) een afschermkap met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • in geval van een <u>zij-/opwaartse bespuiting</u>: - <u>Hoge laanbomen</u>: een techniek uit tenminste klasse DRT95 - <u>Opzetters en spillen</u> een techniek uit tenminste klasse DRT90.	bespuiting (rugspuit/spuitlans) een afschermkap, of; • In geval van een <u>zij-/opwaartse bespuiting</u>: - <u>Hoge laanbomen</u>: Een techniek uit tenminste klasse DRT95 in combinatie met een totale teeltvrije zone van 500 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens). In deze teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas, waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten - <u>Opzetters en spillen</u>: Een techniek uit tenminste klasse DRT90 in combinatie met een totale teeltvrije zone van 500 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens). In deze teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas, waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	0,5 L/ha	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens), of; • In geval van handmatige bespuiting (rugspuit/spuitlans) een afschermkap met	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of; • In geval van handmatige bespuiting

		inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens).	(rugspuit/spuitlans) een afschermkap.
--	--	--	---------------------------------------

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Let op: Een toepassing in de teelt van komkommer kan gewasschade tot gevolg hebben.

Let op: In vruchtgroenten is de gewasveiligheid in de wintermaanden niet onderbouwd, voer een proefbespuiting uit voor het middel op grote schaal toegepast wordt.

Let op: In bloemisterijgewassen kan enige tijdelijke gewasschade optreden. Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloemisterijgewassen is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel wordt aangeraden om eerst een proefbespuiting uit te voeren om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Let op: Bij hoge plaagdruk van wittevlies in de teelt van paprika kan voor een goede werking een aanvullende behandeling met een middel op basis van een andere werkzame stof noodzakelijk zijn.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof flupyradifuron. Flupyradifuron behoort tot de butenoliden. De IRAC code is 4D. Bij dit product bestaat er risico op resistentieontwikkeling. Wissel het middel af met middelen met een ander werkingsmechanisme. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.