

2 november 2018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Appel	Schurft ¹ Echte meeldauw ²	0,02% (20 gram middel per 100 liter water)	0,2 kg/ha	4	7	28
Peer	Schurft ¹	0,02% (20 gram middel per 100 liter water)	0,2 kg/ha	4	7	28
Vruchtboomonderstammen en vruchtbomenteelt van appel en peer	Schurft ¹ Echte meeldauw ²	0,02% (20 gram middel per 100 liter water)	0,2 kg/ha	4	7	28

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Aardbei (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	0,03% (30 gram middel per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2	7	7
Aardbei (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	0,03% (30 gram middel per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2	7	7
Aalbes (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ⁴	0,02% (20 gram middel per 100 liter water)	0,2 kg/ha	3	10	21
Kruisbes (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ⁴	0,02% (20 gram middel per 100 liter water)	0,2 kg/ha	3	10	21

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Blauwe bes (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ⁴	0,02% (20 gram middel per 100 liter water)	0,2 kg/ha	3	10	21
Veenbes (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ⁴	0,02% (20 gram middel per 100 liter water)	0,2 kg/ha	3	10	21

¹ Schurft (*Venturia inaequalis*, *Venturia pirina*)

² Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

³ Echte meeldauw (*Sphaerotheca macularis*)

⁴ Echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*, *Microsphaera* spp.)

Toepassingsvoorwaarden

Toepassen in appel, peer vanaf BBCH 53, het openen van de knoppen (uitbotten) waarbij de bloemen nog omhuld zijn door groene blaadjes, tot BBCH 81, het begin van de afrijping.

Toepassen in de onbedekte teelten van aalbes, kruisbes, veenbes en blauwe bes, vanaf BBCH 51, het zwellen van de knoppen, tot BBCH 85, gevorderde afrijping waarbij de eerste bessen de cultivar specifieke kleur krijgen.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de periode van 1 september tot 1 maart in de onbedekte teelten van:

- appel
- peer
- Vruchtboomonderstammen en vruchtbomenteelt van appel en peer
- aalbes (onbedekte teelt)
- kruisbes (onbedekte teelt)
- blauwe bes (onbedekte teelt)
- veenbes (onbedekte teelt)

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van appel en peer op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien:

- voor 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT99, of van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.
- vanaf 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95, of van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van in de onbedekte teelt van bessen (exclusief veenbes) (zij-of opwaarts gespoten) op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90, of van een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of ras, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

Resistentie management

Dit middel bevat de werkzame stof kresoxim-methyl. Kresoxim-methyl behoort tot de oximinoacetaten. De FRAC code is 11. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.