

Tellus, 15639 N

6 juli 2018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type Toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Tomaat (bedekte teelt)	Inmengen in het substraat voor de zaai**	Phytophthora ¹ Verwelkingsziekte ²	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100 liter water)			
	Inwerken in de grond voor en/of tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Paprika (bedekte teelt)	Inmengen in het substraat voor de zaai**	Phytophthora ¹ Verwelkingsziekte ²	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100 liter water)			

Toepassingsgebied	Type Toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Inwerken in de grond voor en/of tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Snijbloemen (bedekte teelt)	Inmengen in het substraat voor de zaai**	Phytophthora ¹ Pythium ³ Sclerotinia ^{4,5} Rhizoctonia ⁶	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Aangieten		1% (1 kg/100 liter water)			
	Dompelbehandeling van tray					
	Inwerken in de grond voor planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Potplanten (bedekte teelt)	Inmengen in het substraat voor de zaai**	Phytophthora ¹ Pythium ³ Sclerotinia ^{4,5} Rhizoctonia ⁶	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Aangieten		1% (1 kg/100 liter water)			
	Dompelbehandeling van tray					

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** substraat met minimaal 1% organische stof

¹ Phytophthora (*Phytophthora spp.*)

² Verwelkingsziekte (*Verticillium dahliae*)

³ Pythium (*Pythium* spp.)

⁴ Wortelrot (*Sclerotium rolfsii*)

⁵ Sclerotinia (*Sclerotinia* spp.)

⁶ Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)

⁷ Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Het gebruik in de bedekte teelt van aardbeien, aubergine, sla, spinazie, rucola, andijvie, witlof (trekteelt), veldsla, bonen met peul, boon zonder peul), courgette, komkommer, meloen, koolgewassen, radijs-achtigen, wortelen, bleekselderij, knolvenkel, basilicum en aromatische kruiden is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type Toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Phytophthora ¹	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Sla; <i>Lactuca</i> spp. (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Rhizoctonia ⁶ Sclerotinia ⁷	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5

Toepassingsgebied	Type Toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Andijvie (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Rhizoctonia ⁶	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Spinazie (bedekte teelt)	Inwerken in de grond voor/tijdens planten	Rhizoctonia ⁶	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	2	5
Witlof (trekteelt, bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Rhizoctonia ⁶	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	2	5
Veldsla (bedekte teelt)	Inwerken in de grond voor/tijdens planten	Rhizoctonia ⁶	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	2	5
Rucola (bedekte teelt)	Inwerken in de grond voor/tijdens planten	Rhizoctonia ⁶	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	2	5
Boon met peul (bedekte grondgebonden teelt)	Inwerken in de grond voor/tijdens planten	Rhizoctonia ⁶ Sclerotinia ⁷	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	2	5
Courgette (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Phytophthora ¹ Sclerotinia ⁷	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L			

Toepassingsgebied	Type Toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
			water)			
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Komkommer (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Phytophthora ¹ Pythium ³ Zwart wortelrot ⁸	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Meloen (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Phytophthora ¹ Pythium ³ Zwart wortelrot ⁸	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Aubergine (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Verwelkingsziekte ² Pythium ³ Zwart wortelrot ⁸	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5

Toepassingsgebied	Type Toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Koolgewassen (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Pythium ³	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha		2 na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Radijs (bedekte grondgebonden teelt)	Inwerken in de grond voor/tijdens planten	Rhizoctonia ⁶	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	2 per teeltcyclus (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Wortelen (bedekte grondgebonden teelt)	Inwerken in de grond voor/tijdens planten	Rhizoctonia ⁶ Sclerotinia ⁷	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Bleekselderij (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Phytophthora ¹ Verwelkingsziekte ² Pythium ³	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Knolvenkel (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Phytophthora ¹	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			

Toepassingsgebied	Type Toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Inwerken in de grond voor planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5
Artisjok (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Sclerotinia ⁷	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			
Aromatische kruiden (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Pythium ³ Zwart wortelrot ⁸	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Dompelbehandeling van tray		1% (1 kg/100L water)			
Basilicum (bedekte teelt)	Inmengen in de substraat**	Rhizoctonia ⁶	0,25 kg/m ³ potgrond	2,5 kg/ha	1	-
	Inwerken in de grond voor/tijdens planten		2,5 kg/ha		2 (na substraatbehandeling of tray behandeling is nog 1 behandeling mogelijk)	5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Phytophthora (*Phytophthora* spp.)

² Verwelkingsziekte (*Verticillium dahliae*)

³ Pythium (*Pythium* spp.)

⁴ Wortelrot (*Sclerotium rolfsii*)

⁵ Sclerotinia (*Sclerotinia* spp.)

⁶ Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)

⁷ Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*)

⁸ Zwart wortelrot (*Thielaviopsis basicola*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Voor het inwerken door de grond dient Tellus toegepast te worden met een volume van 800-1500 L water /ha.

Bevat *Trichoderma asperellum* ICC012 en *Trichoderma gamsii* ICC080. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.