

21 februari 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Appel (onbedekte teelt)	Schurft ¹	5 kg/ha	8 per 12 maanden	40 kg/ha per 12 maanden	7	1
Vruchtbomenteelt en vruchtbomenonderstammen van appel (onbedekte teelt)	Schurft ¹	5 kg/ha	8 per 12 maanden	40 kg/ha per 12 maanden	7	-
Komkommer (bedekte teelt)	Echte meeldauw ²	3 kg/ha	8 per teeltcyclus	24 kg/ha per teeltcyclus	7	1
Courgette (bedekte teelt)	Echte meeldauw ²	3 kg/ha	8 per teeltcyclus	24 kg/ha per teeltcyclus	7	1
Augurk (bedekte teelt)	Echte meeldauw ²	3 kg/ha	8 per teeltcyclus	24 kg/ha per teeltcyclus	7	1
Tomaat (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	3 kg/ha	8 per teeltcyclus	24 kg/ha per teeltcyclus	7	1
Paprika (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	3 kg/ha	8 per teeltcyclus	24 kg/ha per teeltcyclus	7	1
Aubergine (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	3 kg/ha	8 per teeltcyclus	24 kg/ha per teeltcyclus	7	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Schurft (*Venturia inaequalis*)

² Echte meeldauw (*Erysiphe chicoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Sphaerotheca fusca*)

³ Echte meeldauw (*Leveillula taurica*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van komkommer, courgette, augurk, tomaat, paprika en aubergine het middel toepassen in een watervolume van 500-1500 liter water per ha.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Let op: Bij de toepassing van dit middel in appel kan niet uitgesloten worden dat er gewasreacties op kunnen treden.

Let op: In de teelt van komkommer wordt in verband met fytotoxiciteit het aangeraden om een toepassing met SchimmelVrij Armicarb af te wisselen met een ander toegelaten middel.

Let op: In de wintermaanden kan het middel gewasschade veroorzaken in komkommer, courgette, augurk, tomaat, paprika en aubergine.