

Actueel WG van het middel Prosaro Plus, 15932 N

6 december 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Wintertarwe	Meeldauw ¹ , gele roest ² , kafjesbruin ³ , bladvlekkenziekte ⁴ , DTR ⁶ , bruine roest ⁵ , fusarium ⁷ , oogvlekkenziekte ⁸	1,25 L/ha	1
Wintergerst	Meeldauw ¹ , oogvlekkenziekte ⁸ , dwergroest ⁹ , netvlekkenziekte ¹⁰ , bladvlekkenziekte ¹¹	1,25 L/ha	1
Winterrogge	Meeldauw ¹ , bruine roest ⁵ , oogvlekkenziekte ⁸ , bladvlekkenziekte ¹¹	1,25 L/ha	1

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Triticale	Meeldauw ¹ , bladvlekkenziekte ⁴ , bruine roest ⁵ , fusarium ⁷	1,25 L/ha	1
Zomertarwe	Meeldauw ¹ , gele roest ² , kafjesbruin ³ , bladvlekkenziekte ⁴ , DTR ⁶ , bruine roest ⁵ , fusarium ⁷ , oogvlekkenziekte ⁸	1,25 L/ha	1
Zomergerst	Meeldauw ¹ , oogvlekkenziekte ⁸ , dwergroest ⁹ , netvlekkenziekte ¹⁰ , bladvlekkenziekte ¹¹	1,25 L/ha	1
Zomerrogge	Meeldauw ¹ , bruine roest ⁵ , oogvlekkenziekte ⁸ , bladvlekkenziekte ¹¹	1,25 L/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Meeldauw (*Blumeria graminis*)

² Gele roest (*Puccinia striiformis*)

³ Kafjesbruin (*Septoria nodorum* / *Leptosphaeria nodorhynchoum* / *Parastagonospora nodorum*)

⁴ Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici* / *Zymoseptoria tritici*)

⁵ Bruine roest (*Puccinia recondita*)

⁶ DTR (*Pyrenophora tritici-repentis*)

⁷ Fusarium (*Fusarium* spp.)

⁸ Oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora herpotrichoides/Oculimacula yallundae*)

⁹ Dwergroest (*Puccinia hordei*)

¹⁰ Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

¹¹ Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*).

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van granen het middel toepassen in 200 tot 400 L water per ha.

Draag handschoenen bij werkzaamheden met behandeld gewas.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen prothioconazool en spiroxamine. Prothioconazool behoort tot de Demethylation Inhibitors (DMI-fungiciden). De FRAC code is 3. Spiroxamine behoort tot de morfolineverbindingen. De FRAC code is 5. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.