

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

6 maart 2015

Actueel WG van het middel LUXAN MOLLENTABLETTEN, 8717 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als mollen- en woelrattenbestrijdingsmiddel door middel van begassing (fumigatie) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Veiligheidstermijn
Akkerbouwgewassen	Mollen ¹ en woelratten ²	1-2 tabletten per 3-5 m gang / hoop op lichte grond	-
Cultuurgrasland			3 dagen tussen toepassing en beweiden en/of maaien
Fruitgewassen (onbedekte teelt)		1-2 tabletten per 8-10 m gang / hoop op andere grondsoorten	-
Groenteteelt (onbedekte teelt)			-
Sierteeltgewassen (onbedekte teelt)			-
Akkerranden			-

¹ mollen (*Talpa europaea*)

² woelratten (*Arvicola amphibius* = *A. terrestris*)

Toepassingsvoorwaarden:

Het middel mag uitsluitend beroeps- en bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad worden gehouden door:

- de handel;
- de personen die in het bezit zijn van een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding die is afgegeven of verlengd door de Minister van Economische Zaken of een andere bevoegde autoriteit;
- ondernemers van bedrijven en/of hoofdverantwoordelijken voor een instelling waar een beheerder in dienst is die beschikt over een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding.

Het middel mag worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs Mollen- en Woelratten bestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de Minister van Economische Zaken.

Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen.

De concentratie van fosfine buiten de gevarenszone moet lager zijn dan 0,01 ppm. Andere personen dan de gebruiker mogen pas opnieuw worden toegelaten, als toestemming wordt gegeven en de concentratie van fosfine lager is dan 0,01 ppm (of 0,014 mg/m³).

Toepassing is uitsluitend toegestaan in molshopen en -gangen en woelratgangen.

Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat.

Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt.

Om vogels en zoogdieren te beschermen dienen de mollen- en woelratgangen goed afgesloten te worden en mogen geen tabletten op het grondoppervlak blijven liggen.