

3 maart 2023

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2, Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Gewasverspreiding door hommels	Grauwe schimmel ⁽²⁾	5 - 10 g / hommelmast	1-2 hommelmasten / 1000 m ² kas ⁽³⁾	25	1 ⁽⁶⁾
Framboos (bedekte teelt)	Gewasverspreiding door hommels	Grauwe schimmel ⁽²⁾	5 - 10 g / hommelmast	1-2 hommelmasten / 1000 m ² kas ⁽³⁾	25	1 ⁽⁶⁾
Groenteteelt (bedekte teelt)	Menging door teeltsubstraat	Zaad- en bodem-schimmels ⁽¹⁾	200 – 500 g /m ³ grond ⁽⁴⁾	500 g /m ³	2	21
	Aangietbehandeling		50 – 100 kg/ha ⁽⁵⁾	100 kg/ha	4	21
Aromatische kruidgewassen (bedekte teelt)	Menging door teeltsubstraat	Zaad- en bodem-schimmels ⁽¹⁾	200 – 500 g /m ³ grond ⁽⁴⁾	500 g /m ³	2	21
	Aangietbehandeling		50 – 100 kg/ha ⁽⁵⁾	100 kg/ha	4	21
Aromatische wortelgewassen (bedekte teelt)	Menging door teeltsubstraat	Zaad- en bodem-schimmels ⁽¹⁾	200 – 500 g /m ³ grond ⁽⁴⁾	500 g /m ³	2	21
	Aangietbehandeling		50 – 100 kg/ha ⁽⁵⁾	100 kg/ha	4	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Menging door teeltsubstraat	Zaad- en bodem-schimmels ⁽¹⁾	200 – 500 g /m ³ grond ⁽⁴⁾	500 g /m ³	2	21
	Aangietbehandeling		50 – 100 kg/ha ⁽⁵⁾	100 kg/ha	4	21

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Zaad- en bodemschimmels (*Pythium* spp., *Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp. en *Fusarium* spp.)

² Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

³ Het aantal nesten / Ha is afhankelijk van ras en van type nest

⁴ Het poeder eerst verdunnen met water tot een 2% suspensieconcentratie: gebruik 10-25 L van de 2% suspensieconcentratie per m³ grond

⁵ Het poeder eerst verdunnen met water tot een 0,5% suspensieconcentratie: gebruik 10.000 – 20.000 L water per Ha

⁶ Het interval is afhankelijk van de activiteit van de hommels, van aardbei- en framboosras en bloemen dichtheid.

Overige toepassingsvoorwaarden

Het verdunde product roeren tijdens gebruik.

Let op: Het middel preventief inzetten.

Bevat micro-organisme *Clonostachys rosea* J1446. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.