

4 mei 2023

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Druif (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ³ Echte meeldauw ⁴	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	3 - 4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹	3 - 4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-
Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt)	Echte meeldauw ²	3 - 4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** toepassing in spuitprogramma of tankmix met andere toegelaten middelen, werkzaamheid van het product is solo niet aangetoond.

¹ Echte meeldauw (*Sphaerotheca fuliginea*)

² Echte meeldauw (*Oidium lycopersicon*)

³ Valse meeldauw (*Plasmopara viticola*)

⁴ Echte meeldauw (*Uncinula necator*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Steenvruchten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ⁵	3 - 4 L/ha	5 per 12 maanden	7	-
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ⁷	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Aardbei (bedekte teelt)	Echte meeldauw ⁶	3 - 4 L/ha	5 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	7	-
Aardbei (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ⁸	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Bessen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ⁷	3 - 4 L/ha	5 toepassingen per 12 maanden	7	-
Bessen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ⁹	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Braam- en framboos-achtigen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ⁸	3 - 4 L/ha	5 toepassingen per 12 maanden	7	-
Braam- en framboos-achtigen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²³ Echte meeldauw ¹⁰	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Druif (bedekte teelt)	Echte meeldauw ⁹	3 - 4 L/ha	5 toepassingen per 12 maanden	7	-
Bladgroenten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ^{10,11}	3 - 4 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	7	-
Sla (<i>Lactuca</i> spp)	Valse meeldauw ²⁵	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3

(onbedekte teelt)	Echte meeldauw ^{12,13}				
Andijvie (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{12,13}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁶ Echte meeldauw ^{12,13}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Baby leaves (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{12,13}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Peulgroenten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹²	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	7	-
Boon met peul (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ¹⁴	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Boon zonder peul (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ¹⁴	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁷ Echte meeldauw ¹⁴	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁷ Echte meeldauw ¹⁴	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁸ Echte meeldauw ¹⁰	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Vruchtgroenten van cucurbitaceae niet eetbare schil (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁸ Echte meeldauw ¹⁰	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Vruchtgroenten van Solanaceae (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁹ Echte meeldauw ²²	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Okra (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁰	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-
Bloemkool (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	7	-
Chinese kool (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3-4 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	7	-
Koolrabi (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3 – 4 L/ha	5	7	-
Radijsachtigen	Echte meeldauw ¹³	3 – 4 L/ha	5	7	-

(bedekte teelt)					
Suikerwortel (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁴	3 – 4 L/ha	5	7	-
Wortelpeterselie (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁴	3 – 4 L/ha	5	7	-
Pastinaak (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁴	3 – 4 L/ha	5	7	-
Knolraap (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3 – 4 L/ha	5	7	-
Koolraap (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3 – 4 L/ha	5	7	-
Aardpeer (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3 – 4 L/ha	5	7	-
Japanse aardappel (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3 – 4 L/ha	5	7	-
Zoete aardappel (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3 – 4 L/ha	5	7	-
Rode biet (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3 – 4 L/ha	5	7	-
Knolselderij (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3 – 4 L/ha	5	7	-
Schorseneer (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹³	3 – 4 L/ha	5	7	-
Bosui (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁶	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-
Stengelgroenten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁵	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	7	-
Kruidenteelt (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁵	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	7	-
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁵	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	7	-

Snijbloemen grondgebonden teelt met één teeltcyclus per jaar (bedekte teelt)	Echte meeldauw ^{13,15,16,17,18}	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen grondgebonden teelt met meerdere teeltcycli per jaar (bedekte teelt)	Echte meeldauw ^{13,15,16,17,18}	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen niet grondgebonden teelt met één teeltcyclus per jaar (bedekte teelt)	Echte meeldauw ^{13,15,16,17,18}	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen niet grondgebonden teelt met meerdere teeltcycli per jaar (bedekte teelt)	Echte meeldauw ^{13,15,16,17,18}	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	7	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{15,17,18,19,20}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Potplanten m.u.v. eenjarige perkplanten, bolbloemen en knolbloemen, cactussen en succulenten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ^{13,15,16,17,18}	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	7	-
Trekheesters en snijgroen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ^{13,15,16,17}	3 – 4 L/ha	5 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ^{5,15}	3 – 4 L/ha	5 per 12 maanden	7	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{7,17}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Klimplanten (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{7,17}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Sierheesters (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{7,17}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{7,17}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Heide soorten	Valse meeldauw ²⁴	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3

(onbedekte teelt)	Echte meeldauw ^{7,17}				
Bos-en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{7,17}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{7,17}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Roos (bedekte teelt)	Echte meeldauw ^{5,15}	3 – 4 L/ha	15 per 12 maanden	7	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁵	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{7,17}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁵	3 – 4 L/ha	5 per teeltcyclus	7	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²⁴ Echte meeldauw ^{7,17}	2 L/ha**	8 per 12 maanden	8	3
Veredeling en zaadteelt van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen	Echte meeldauw ¹⁵	3 – 4 L/ha	5 per 12 maanden	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Toepassing in spuitprogramma of tankmix met andere toegelaten middelen, werkzaamheid van het product is solo niet aangetoond.

⁵ Echte meeldauw (*Podosphaera pannosa*)

⁶ Echte meeldauw (*Sphaerotheca macularis*)

⁷ Echte meeldauw (*Sphaerotheca mors-uvae*)

⁸ Echte meeldauw (*Sphaerotheca aphanis*)

⁹ Echte meeldauw (*Uncinula necator*)

¹⁰ Echte meeldauw (*Sphaerotheca fuliginea*)

¹¹ Echte meeldauw (*Erysiphe cichoracearum*)

¹² Echte meeldauw (*Erysiphe pisi*)

¹³ Echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)

¹⁴ Echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)

¹⁵ Echte meeldauw (*Erysiphe* spp.)

¹⁶ Echte meeldauw (*Leveillula taurica*)

- ¹⁷ Echte meeldauw (*Sphaerotheca* spp.)
- ¹⁸ Echte meeldauw (*Oidium* spp.)
- ¹⁹ Echte meeldauw (*Microsphaera* spp.)
- ²⁰ Echte meeldauw (*Podosphaera pannosa*)
- ²¹ Echte meeldauw (*Sphaerotheca fuliginea*)
- ²² Echte meeldauw (*Oidium lycopersicon*)
- ²³ Valse meeldauw (*Peronospora rubi*)
- ²⁴ Valse meeldauw (*Peronospora* spp)
- ²⁵ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)
- ²⁶ Valse meeldauw (*Peronospora farinos f. Sp. Spinaciae*)
- ²⁷ Valse meeldauw (*Peronospora viciae f. Sp. Pisi*)
- ²⁸ Valse meeldauw (*Pseudoperonospora cubensis*)
- ²⁹ Valse meeldauw (*Phytophthora infestans*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de onbedekte teelt van druif het middel toepassen met 400-1000 liter water per ha.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Dit product is een preventief biologisch fungicide ter bestrijding van meeldauw. Voor een goede werking van het product moet de bespuiting voornamelijk gericht zijn op de onderzijde van het blad.

Toepassen in direct zonlicht dient vermeden te worden, in het bijzonder bij hogere temperaturen.