

18 februari 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Druif (bedekte boomkwekerij)	dompelbehandeling	Esca ¹	0,2 kg/100 L water**	-	4 (zie tabel toepassingstijdstip)	-	-
Druif (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Esca ¹	0,2 kg/ha***	0,2 kg/ha	2	7	-
Tomaat (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Botrytis ²	5-10 g/100 L water	0,15 kg/ha	8	5	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** 100 L water voor 3x1000 planten (de dompelveleistoof in de container kan 3 keer gebruikt worden);

*** Low volume toepassing in 100 liter water per ha tijdens rustperiode van het gewas.

¹ Esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Phaeoacremonium aleophilum*)

² Botrytis (*Botrytis cinerea*/ *Botryotinia fuckeliana*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Peulvruchten	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ⁵	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Oliehoudende zaden	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ⁵	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Vezelgewassen	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ⁵	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Groenbemesters	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ⁵	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Pitvruchten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Taksterfte ⁸ Schurft ⁹	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Peer (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling en bodembehandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken	Zwartvruchtrot ⁶	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2	7	-
Steenvruchten	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
(onbedekte teelt)		Tak-en bloesemsterfte, vruchtrot (Monilia) ⁴ , Grauwe schimmel ²			8	7	1
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² , Echte meeldauw ¹⁰	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Aardbei (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² , Echte meeldauw ¹⁰	10-20 g/100 L water	0,2 kg/ha	8	7	1
Bessen	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2	7	-
		Grauwe schimmel ²			8		1
Druif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ²	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Braam- en framboos- achtigen	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2	7	-
		Grauwe schimmel ²			8		1
Noten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2	7	-
		Grauwe schimmel ²			8		1
Vijg (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2	7	-
		Grauwe schimmel ²			8		1
Kiwi (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2	7	-
		Grauwe schimmel ²			8	7	1
Bladgroenten m.u.v. sla	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ⁵ , Bladvlekkenziekte ¹¹	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Sla (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² , Sclerotiënrot ⁵	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Sla (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ⁵	10-20 g/100 L water	0,2 kg/ha	8	7	1
Peulgroenten	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ⁵	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Vruchtgroenten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ⁵ , Echte meeldauw ¹²	0,15 kg/ha	0,15 kg/ha	8	5	1
Vruchtgroenten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² , Sclerotienrot ⁵ , Echte meeldauw ¹²	5-10 g/100 L water	0,15 kg/ha	8	5	1
Vruchtgroenten (bedekte teelt)	Bespuiting van de vruchten, of Dompelbehandeling van de vruchten, na-oogst	Grauwe schimmel ²	10-20 g/100 L water	20 g/100 L water	1	-	1
Koolgewassen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ²	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Wortel- en knolgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ²	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Ui-achtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ⁷	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Stengelgroenten (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Grauwe schimmel ² , Bladvlekkenziekte ¹¹	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Kruidenteelt vers of gedroogd	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ²	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	1
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur ¹³	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	8	7	-
Bloemisterijgewassen (bedekte opkweek)	Dompelbehandeling	Grauwe schimmel ²	10-20 g/100 L water	0,2 kg/ha	1	-	-
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Bespuiting van het geoogste gewas, na-oogst	Grauwe schimmel ²	0,2 g/L (0,005 g per bloem)	400 bloemen per liter oplossing	1	-	-
	Dompelbehandeling van het geoogste gewas, na-oogst			200 bloemen per liter oplossing			
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	10-20 g/100L water	0,2 kg/ha	2	7	-
		Grauwe schimmel ²			8		
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2	7	-
		Grauwe schimmel ²			8		
Boomkwekerijgewassen (bedekte opkweek)	Dompelbehandeling	Grauwe schimmel ²	10-20 g/100 L water	0,2 kg/ha	1	-	-
Boomkwekerijgewassen	Aangietbehandeling	Grauwe schimmel ²	10-20 g/100 L water	0,2 kg/ha	1	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	10-20 g/100L water	0,2 kg/ha	2	7	-
		Grauwe schimmel ²			8		
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2	7	-
		Grauwe schimmel ²			8		
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ²	10-20 g/100L water	0,2 kg/ha	8	7	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Taksterfte ³	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2	7	-
		Grauwe schimmel ²			8		
Bloemenzaadteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ²	10-20 g/100L water	0,2 kg/ha	8	7	-
Moeras- en waterplanten	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Sclerotienrot ⁵	10-20 g/100L water	0,2 kg/ha	8	7	-
Veredeling en zaadteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Sclerotienrot ⁵	10-20 g/100L water	0,2 kg/ha	8	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

² Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*/ *Botryotinia fuckeliana*)

³ Taksterfte, veroorzaakt door plantpathogene schimmels (*Phomopsis* sp., *Didymascella thuijina*, *Kabatina juniperi*, *Cylindrocladium buxicola*, *Volutella buxi*, *Hymenoscyphus fraxineus*, *Chalara* sp., *Eutypa lata*, *Colletotrichum* sp., *Phoma* sp. *Pestalotia* sp., *Monilinia* sp., *Nectria galligena*, *Fusicoccum* sp. etc.)

⁴ Tak- en bloesemsterfte, Vruchtrot (*Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

⁵ Sclerotienrot (*Sclerotinia* sp.)

⁶ Zwartvruchtrot (*Stemphylium vesicarium*)

⁷ Bladvlekkenziekte (*Botrytis squamosa*)

⁸ Taksterfte (*Nectria* sp.)

⁹ Schurft (*Venturia* sp.)

¹⁰ Echte meeldauw (*Sphaerotheca macularis*, *Podosphaera aphanis*)

¹¹ Bladvlekkenziekte (*Septoria* sp.)

¹² Echte meeldauw (*Podosphaera xanthii*, *Leveillula aurica*, *Oidium neolycopersici*)

¹³ Vuur (*Botrytis tulipae*, *Botrytis elliptica*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Roeren tijdens gebruik.

In de teelt van fruitgewassen m.u.v. aardbei het middel toepassen tegen taksterfte en grauwe schimmel in 100-1000 L water/ha, tegen vruchtrot (*Monilinia*) het middel toepassen in 500-2000 L water per ha.

In de teelt van aardbei het middel toepassen in 500-1000 L water per ha.

In de teelt van vruchtgroenten het middel toepassen in 500-1500 L water per ha.

In de teelt van sierteeltgewassen het middel toepassen in 100-1000 L water per ha.

In de teelt van vruchtgroenten toepassen zodra de eerste laterale apicale scheuten van tomatenplanten zichtbaar zijn (BBCH 21) tot de oogst (BBCH 89).

Bevat *Trichoderma atroviride* SC1: Micro-organismen kunnen sensibiliserende reacties veroorzaken.

In de teelt van druif kan de werking variabel zijn. Dit middel is gebaseerd op een micro-organisme en kan bijdragen aan de preventieve bestrijding van Esca in combinatie met preventieve maatregelen.

Toepassingsstijdstip	Methode
Na het klaarmaken van de onderstammen en stekken, vóór de koude bewaring	Onderdompelen van de onderstammen en stekken
Tijdens de rehydratatie, vóór het enten	Onderdompelen van de onderstammen en stekken