

Spintack, 16911 N

Datum dagtekening besluit: 26 november 2025

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Appel (onbedekte teelt)	Mijten ^{1, 2}	0,09% (90 ml per 100 liter water)	0,9 L/ha	1	-	30
Peer (onbedekte teelt)	Mijten ^{1, 2}	0,09% (90 ml per 100 liter water)	0,9 L/ha	1	-	30
Kers (onbedekte teelt)	Mijten ¹	0,09% (90 ml per 100 liter water)	0,9 L/ha	1	-	21
Pruim (onbedekte teelt)	Mijten ¹	0,09% (90 ml per 100 liter water)	0,9 L/ha	1	-	21
Tomaat (bedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2	7	3
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 L/ha	3 per blok**, max 3 blokken per 12 maanden	7 dagen binnen een blok, 28 dagen tussen twee blokken	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Mijten ^{1, 2}	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 L/ha	3 per blok**, max 3 blokken per 12 maanden	7 dagen binnen een blok, 28 dagen tussen twee blokken	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	3 per blok**, max 3 blokken per 12 maanden	7 dagen binnen een blok, 28 dagen tussen twee blokken	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Blokken afwisselen met een mijtenbestrijdingsmiddel met een ander werkingsmechanisme.

¹ Spintmijten (*Tetranychus* spp.)

² Fruitspintmijt (*Panonychus ulmi*)

Het gebruik in de teelt van aardbei (onbedekte opkweek en vermeerderingsteelt), bessen, braam- en framboos-achtigen, komkommer, courgette, aubergine, Dahlia, laanbomen en vruchtbomen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardbei (opkweek, onbedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	0,6 L/ha	2	14	-
Aardbei (vermeerderingsteelt, onbedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	0,6 L/ha	2	14	-
Bessen***	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 L/ha	1	-	-
Braam- en framboos-achtigen***	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 L/ha	1	-	-
Komkommer (bedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per teeltcyclus**, 6 per 12 maanden	7 dagen in een teeltcyclus, 28 dagen tussen twee teeltcycli	3
Courgette (bedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2 per teeltcyclus**, 4 per 12 maanden	7 dagen in een teeltcyclus, 28 dagen tussen twee teeltcycli	3
Aubergine (bedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1 L/ha	2	7	3

Dahlia (onbedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	0,4 L/ha	1	-	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	Mijten ^{1, 2}	0,09% (90 ml per 100 liter water)	0,9 L/ha	1	-	-
Vruchtbomen (boomkwekerij) (onbedekte teelt)	Mijten ^{1, 2}	0,09% (90 ml per 100 liter water)	0,9 L/ha	1	-	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Toepassingen afwisselen met een mijtenbestrijdingsmiddel met een ander werkingsmechanisme.

*** Het middel na de oogst (BBCH 90-93) toepassen.

¹ Spintmijten (*Tetranychus* spp.)

² Fruitspintmijt (*Panonychus ulmi*)

Het gebruik in de teelt van aardbei (bedekte vermeerderingsteelt) en voor Veredeling en zaadteelt is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door Glastuinbouw Nederland. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (vermeerderingsteelt, bedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 L/ha	3	7
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Mijten ¹	0,1% (100 ml per 100 liter water)	1,2 L/ha	3	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Spintmijten (*Tetranychus* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van appel, peer, kers, pruim, komkommer, courgette, aubergine, tomaat, laanbomen en vruchtbomen het middel toepassen in 1000 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van aardbei het middel toepassen in 600 liter water per ha.

In de bedekte veredeling en zaadteelt het middel toepassen in 200 tot 1200 liter water per ha.

In de teelt van bessen, braam- en framboos-achtigen het middel alleen na de oogst (BBCH 90-93) toepassen.

In op- en zijwaartse toepassingen in onbedekte teelten uitsluitend toepassen met machinaal voortbewogen apparatuur.

Bij veldtoepassing in bessen, braam- en framboos-achtigen is uitsluitend neerwaartse bespuiting toegestaan.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van appel, peer, kers, pruim en vruchtbomen (boomkwekerijgewassen) in percelen die grenzen aan oppervlaktewater vóór 1 mei en in het najaar vanaf het moment van 50% bladval uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Let op: Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel dient eerst een proefbespuiting te worden uitgevoerd om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Let op: In de teelt van rozen, ficus en potroos kan, afhankelijk van de cultivar, een gewasreactie optreden.

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof Acequinocyl. Acequinocyl behoort tot de complex III elektronentransport remmers. De IRAC code is 20B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.