

Actueel WG van het middel IMEX Glyfosaat

29 mei 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Akkerbouwgewassen m.u.v. peulvruchten, vlinderbloemige en grasachtige groenbemesters en vlinderbloemige voedergewassen	Doodspuiten, voor het zaaien of planten van het gewas	Dekvruchten: gras, rogge en gerst	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	-
Akkerbouwgewassen	Pleksgewijs spuiten ³	Onkruiden	0,5-1% (5-10 mL in 1 L water)	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	10
Aardappelen	Behandeling voor opkomst	Eenjarige onkruiden	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Bieten	Behandeling voor opkomst	Eenjarige onkruiden	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
	Pleksgewijs spuiten ¹	Aardappelopslag	0,75-1,5% (7,5-15 ml in 1 liter water)	0,3 L/ha ²	1 per teeltcyclus	10
Mais	Pleksgewijs spuiten ¹	Aardappelopslag	0,75-1,5% (7,5-15 ml in 1 liter water)	0,3 L/ha ²	1 per teeltcyclus	10

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Grasachtige groenbemesters	Doodspuiten, over het gewas	Grasachtige groenbemesters	1,0 - 2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	-
Cultuurgrasland	Pleksgewijs spuiten ³	Onkruiden	0,5-1% (5-10 mL in 1 L water)	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	-
Voedergrasland	Behandeling over het gewas	Eenjarige onkruiden en gras	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	-
Groot fruit (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten ³	Onkruiden	0,5-1% (5-10 mL in 1 L water)	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	-
Appel (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling	Eenjarige onkruiden	2,0 L/ha op zwartstrook	1,0 L/ha in boomgaard	1 per 12 maanden	-
Peer (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling	Eenjarige onkruiden	2,0 L/ha op zwartstrook	1,0 L/ha in boomgaard	1 per 12 maanden	-
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling	Eenjarige onkruiden	2,0 L/ha op zwartstrook	1,0 L/ha in boomgaard	1 per 12 maanden	-
Klein fruit (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten ³	Onkruiden	0,5-1% (5-10 mL in 1 L water)	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	10
Noten (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten ³	Onkruiden	0,5-1% (5-10 mL in 1 L water)	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	-
Vijg (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten ³	Onkruiden	0,5-1% (5-10 mL in 1 L water)	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	10
Kiwi (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten ³	Onkruiden	0,5-1% (5-10 mL in 1 L water)	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	10
Groenteteelt (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten ³	Onkruiden	0,5-1% (5-10 mL in 1 L water)	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	10
Uien (onbedekte teelt)	Behandeling voor opkomst	Eenjarige onkruiden	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Asperge (onbedekte teelt)	Behandeling voor opkomst; voor of na de oogst	Eenjarige onkruiden	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Kruidenteelt (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten ³	Onkruiden	0,5-1% (5-10 mL in 1 L water)	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	10
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	Behandeling voor opkomst	Eenjarige onkruiden	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
	Doodspuiten voor het planten of zaaien van het gewas	Dekvruchten: gras, rogge en gerst	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	-
Narcis (meerjarige, onbedekte teelt)	Behandeling na afsterven van het loof voordat nieuwe uitloop begint	Eenjarige onkruiden	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten ³	Onkruiden	0,5-1% (5-10 mL in 1 L water)	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	-
Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akkerranden	Spuiten over het onkruid	Eenjarige onkruiden	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Alleen toepassen met speciaal voor dit doel ontwikkelde apparatuur die het gewas volledig afschermt.

² Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

³ Toepassen met afschermkap.

16711N

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan het behandeld gewas.

Gras van behandelde percelen niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.

Voor zilte teelten (lamsoor, zeekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is pleksgewijze toepassing met handspuit in de teelt van akkerbouwgewassen, bieten, mais, cultuurgrasland, groot fruit, kleinfruit, noten, vijg, kiwi, groententeelt, kruidenteelt en sierteeltgewassen, uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een handgedragen spuit met spuitkap in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 350 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij/bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Dit middel mag niet worden toegepast op open, halfopen en gesloten verhardingen.