

4 september 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,6 L/ha ¹	2 per teeltcyclus	1,6 L/ha per teeltcyclus	10
			1 L/ha ²	1 per teeltcyclus		-
			0,2 - 0,4 L/ha ³	8 per teeltcyclus		7
Graszaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras	Over het gewas	Vogelmuur ⁴	1 L/ha	1 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

- ¹ In combinatie met 3,5 L/ha fenmedifam (160 g/L)
- ² In combinatie met 5 L/ha fenmedifam (160 g/L)
- ³ In LDS-systeem met toegelaten middelen
- ⁴ Vogelmuur (*Stellaria media*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Graszaadteelt m.u.v. Engels en Italiaans raaigras	Over het gewas	Vogelmuur ⁴	1 L/ha	1 per 12 maanden	1 L/ha per 12 maanden	-	-
Graszodenteelt (onbedekte teelt)	Voor opkomst of	Vogelmuur ⁴	0,8 L/ha	1 per teeltcyclus	1,6 l/ha per teeltcyclus	-	-
	Na opkomst		1 L/ha	1 per 12 maanden		-	
		Eenjarige onkruiden	0,2-0,4 L/ha ³	8 per teeltcyclus		7	
Witlof (pennenteelt) (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1 - 0,2 L/ha ³	4 per teeltcyclus	0,4 L/ha per teeltcyclus	7	-
Cichorei (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1 - 0,2 L/ha ³	4 per teeltcyclus	0,4 L/ha per teeltcyclus	7	-
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)	Na opkomst	Vogelmuur ⁴	0,6 L/ha	2 per teeltcyclus	1,6 l/ha per teeltcyclus	10	-
		Eenjarige onkruiden	0,2-0,4 l/ha ³	8 per teeltcyclus		7	-
Spinazie (onbedekte teelt)	Voor-zaai of voor-opkomst	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per teeltcyclus	0,8 l/ha per teeltcyclus	-	42
Snijbiet (onbedekte teelt)	Voor-zaai of voor-opkomst	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per teeltcyclus	0,8 l/ha per teeltcyclus	-	42

Tuinmelde (onbedekte teelt)	Voor-zaai of voor-opkomst	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per teeltcyclus	0,8 l/ha per teeltcyclus	-	42
Boon met peul (onbedekte teelt)	Na opkomst, bij 1-3 drievoudige bladeren (BBCH 11-13)	Vogelmuur ⁴	1 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	-	-
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Na opkomst, bij 1-3 drievoudige bladeren (BBCH 11-13)	Vogelmuur ⁴	1 l/ha	1 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	-	-
Rode biet (onbedekte teelt)	Voor opkomst of	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per teeltcyclus	1,6 l/ha per teeltcyclus	-	-
	Na opkomst		0,6 l/ha	2 per teeltcyclus		10	
			1 l/ha	1 per teeltcyclus		-	
		Eenjarige onkruiden	0,2 - 0,4 l/ha ³	8 per teeltcyclus		7	
Bonenkruid, peterselie, majoraan, oregano, rozemarijn, salie, tijm (onbedekte teelt)	Na opkomst of na het planten	Vogelmuur ⁴	0,6 l/ha	2 per teeltcyclus	1,2 l/ha per teeltcyclus	10	28
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Voor opkomst of	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per teeltcyclus	1,6 L/ha per teeltcyclus	-	-
	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,2-0,4 l/ha ³	8 per teeltcyclus		7	

Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	Voor opkomst of	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per teeltcyclus	1,6 l/ha per teeltcyclus	-	-
	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,2-0,4 l/ha ³	8 per teeltcyclus		7	
Snijbloemen (onbedekte teelt)	Voor opkomst of	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per teeltcyclus	1,2 l/ha per 12 maanden	-	-
	Na opkomst, onder de planten		0,6 l/ha	2 per teeltcyclus		10	
	Tussen het gewas	Eenjarige onkruiden	0,2-0,4 l/ha ³	6 per teeltcyclus		7	
Trekheesters (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Vogelmuur ⁴	0,6 l/ha	2 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	10	-
		Eenjarige onkruiden	0,2-0,4 l/ha ³	6 per 12 maanden		7	-
Snijgroen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Vogelmuur ⁴	0,6 l/ha	2 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	10	-
		Eenjarige onkruiden	0,2-0,4 l/ha ³	6 per 12 maanden		7	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Voor opkomst of	Vogelmuur ⁴	0,8 l/ha	1 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	-	-
	Tussen het gewas		0,6 l/ha	2 per 12 maanden		10	-
	Eenjarige onkruiden		0,2-0,4 l/ha ³	6 per 12 maanden		7	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	Vogelmuur ⁴	0,6 l/ha	2 per 12 maanden	1,2 l/ha per 12 maanden	10	-

		Eenjarige onkruiden	0,2-0,4 l/ha ³	6 per 12 maanden		7	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Voor opkomst of	Eenjarige onkruiden	0,8 l/ha	1 per 12 maanden	1,6 l/ha per teeltcyclus	-	-
	Na opkomst		1 l/ha	1 per 12 maanden		-	
		Eenjarige onkruiden	0,2-0,4 l/ha ³	8 per 12 maanden		7	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

³ In LDS-systeem met toegelaten middelen.

⁴ Vogelmuur (*Stellaria media*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-300 liter water per ha.

Hooi afkomstig van graszaad productie niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.

In verband met residuen in volggewassen, binnen één maand na toepassing geen bladgroenten, aardappelen, bieten en wortel- en knolgewassen telen.

Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin dit middel werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, zaai- en plantuien.

Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de onbedekte teelt van:

- bolbloemen en knolbloemen
- bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp
- bloemenzaadteelt

Om het grondwater te beschermen mag dit middel bij een na opkomst behandeling tegen eenjarige onkruiden in de onbedekte graszodenteelt en in de onbedekte opkweek- en vermeerderingsteelt van aardbeien, niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de periode van 1 september tot 1 maart