

Actueel WG van het middel Curalia N spray

29 mei 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het niet-professionele gebruik door middel van een bespuiting van de plant onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per jaar	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Minimum termijn tussen de laatste toepassing en de oogst in dagen
Appel (buiten)	Schurft	100 mL/ m ²	5	8	-
Aardbei	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	-
Bessen	Echte meeldauw	80 mL/ m ²	5	7	-
Braam- en framboosachtigen	Echte meeldauw	80 mL/ m ²	5	7	-
Wijndruif (buiten)	Echte meeldauw	100 mL/ m ²	5	7	-
Peulgroenten	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	1
Augurk	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	-
Courgette	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	-
Komkommer	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	-
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet- eetbare schil	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	1
Aubergine	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	-
Tomaat	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	-
Paprika	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	-
Sluitkool	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	1
Spruitkool	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	1

Bloemkool	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	1
Broccoli	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	1
Stengelkool	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	1
Wortel- en knolgewassen	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	1
Sierbeplanting (planten in de volle grond)	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	-
Kuipplanten (buiten)	Echte meeldauw	60 mL/ m ²	8	7	-
Rozen	Echte meeldauw	100 mL/ m ²	5	7	-
Sierheesters	Echte meeldauw	100 mL/ m ²	5	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Overige toepassingsvoorwaarden

Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in huis, (volks)tuin en/of kas.

Schudden voor gebruik.

In bessen en braam- en framboosachtigen toepassen vanaf het moment dat de meeste bloemen verwelkt zijn.

Let op: Voorkom dat nuttige insecten (bv. bijen of lieveheersbeestjes) geraakt worden door de spuitvloeistof.

Let op: Bij toepassing van het middel kunnen gewasreacties optreden. Zorg ervoor dat te oogsten delen niet bespoten worden.