

Actueel WG van het middel Taegro, 15794 N
25 augustus 2026

W.5

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Aardappelen	Grondbehandeling/ veurbehandeling	Rhizoctonia ⁸	0,37- 0,74** kg/ha	0,74 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	4 uur
Bieten	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ⁹	0,37 kg/ha	0,37 kg/ha	3 per teeltcyclus	10-14	n.a.
Aardbei (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,185-0,37 kg/ha**	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Druif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹ Echte meeldauw ²	0,37 kg/ha	0,37 kg/ha	10 per teeltcyclus	7	4 uur

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheid stermijn
Sla; <i>Lactuca</i> spp (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ³	0,185-0,37 kg/ha**	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Courgette (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁴	0,185-0,37 kg/ha**	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Komkommer (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁴	0,185-0,37 kg/ha**	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Meloen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁴	0,185-0,37 kg/ha**	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Watermeloen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁴	0,185-0,37 kg/ha**	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Tomatenziekte ⁵ Echte meeldauw ⁶ Alternaria ⁷	0,185-0,37 kg/ha**	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Wortelen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Suikerwortel (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheid stermijn
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Pastinaak (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Knolraap (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Koolraap (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Aardpeer (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Japanse aardappel (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Zoete aardappel (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Rode biet (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheid stermijn
Knolselderij (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37- 0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Schorseneer (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Mierikswortel (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37-0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur
Yam (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Pythium ¹⁰	0,37- 0,74 kg/ha**	0,74 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	4 uur

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Dosering is afhankelijk van ziektedruk, gewashoogte en klimaatomstandigheden.

¹ Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

² Echte meeldauw (*Erysiphe necator*)

³ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

⁴ Echte meeldauw (*Podosphaera xanthii*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Erysiphe cichoracearum*/Golovinomyces cichoracearum)

⁵ Tomatenziekte (*Phytophthora infestans*)

⁶ Echte meeldauw (*Oidium neolycopersici*, *Leveillula taurica*)

⁷ Alternaria (*Alternaria* spp.)

⁸ Rhizoctonia (*Rhizoctonia* spp.)

⁹ Bladvlekkenziekte (*Cercospora beticola*)

¹⁰ Pythium (*Pythium* spp.)

Het gebruik in onderstaande teelten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Aardappelen	Gewasbehandeling	Loofverbruining ¹²	0,37-0,74 kg/ha**	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Bieten	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Granen	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Maïs	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ² Oogvlekkenziekte ³	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Peulvruchten	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Graszaadteelt	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Oliehoudende zaden	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Vezelgewassen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Echte meeldauw ⁶	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Vlinderbloemige groenbemesters	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Grasachtige groenbemesters	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Kruisbloemige groenbemesters	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Spikkelziekte ⁸	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Facelia, Spurrie, Afrikaantjes, Raketblad, Sudangras, Deder, Bladraap, Zwaardherik, Niger	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Vlinderbloemige voedergrassen	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Stoppelknol	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruining ⁹	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Witlof (pennenteelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁰ Loofverbruining ⁹	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
	Grondbehandeling	Sclerotienrot ⁵ Wortelrot ¹¹	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Cichorei	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁰ Loofverbruining ⁹	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Boekweit	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ⁵	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Hop	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Meekrap	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Miscanthus	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Olifantsgras	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Quinoa	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ⁵ Echte meeldauw ⁷ Loofverbruining ¹²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Wede	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Wouw	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ⁵	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
		Echte meeldauw ⁷ Loofverbruining ¹²				
Sorghum	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ⁵ Echte meeldauw ⁷ Loofverbruining ¹²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Teff	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Gierst	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Russische paardenbloem	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Voedergrasland	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Graszodenteelt	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ⁵ Echte meeldauw ¹	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Pitvruchten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Steenvruchten	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Tak- en bloesemsterfte ¹³	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Aardbei vermeerdering	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁴ Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁴ Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Bessen	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁵ Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Druiven	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶ Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁷ Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Groententeelt, opkweek	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵ Loofverbruining ¹² Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	3 per teeltcyclus	3	-
	Traybehandeling	<i>Pythium sp</i> ¹⁸	0,37 kg/ha	2 per teeltcyclus	-	-

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
		<i>Phytophthora sp.¹⁹</i> <i>Rhizoctonia sp.²⁰</i>				
Bladgroenten (m.u.v. de bedekte teelt van sla)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Bladgroenten	Grondbehandeling	<i>Rhizoctonia sp.²⁰</i>	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	4 uur
Boon met peul (groen te oogsten)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵ Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Boon zonder peul (groen te oogsten)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵ Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Erwt met peul (groen te oogsten)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Erwt zonder peul (groen te oogsten)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> eetbare schil met uitzondering van	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
de bedekte teelt van courgette en komkommer						
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> niet eetbare schil met uitzondering van meloen en watermeloen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Okra	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Echte meeldauw ⁷	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Koolgewassen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵ Spikkelziekte ⁸	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Radijsachtigen	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ⁵ Spikkelziekte ⁸	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
	Grondbehandeling	<i>Pythium spp.</i> ¹⁸	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	4 uur
Wortelgewassen	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²¹ Sclerotienrot ⁵ Loofverbruining ¹²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Wortelgewassen (bedekte teelt)	Grondbehandeling	<i>Pythium spp.</i> ¹⁸	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	4 uur

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en yam (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²² Sclerotienrot ⁵ Spikkelziekte ⁸	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Uien	Gewasbehandeling	Loofverbruining ¹² Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Sjalotten	Gewasbehandeling	Loofverbruining ¹² Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Bosuien	Gewasbehandeling	Loofverbruining ¹² Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Knoflook	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Stengelgroenten m.u.v. zeekraal en zeekool	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵ Loofverbruining ¹²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Kruiden (vers en gedroogd)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruining ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	4 uur
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
	Grondbehandeling	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Voorjaarsgeplante bloembollen en bloemknollen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
	Grondbehandeling	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Najaarsgeplante bloembollen en bloemknollen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
	Grondbehandeling	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Bloemisterijgewassen (opkweek)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵	0,37 kg/ha	2 per teeltcyclus	3	-

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
		Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²				
	Traybehandeling	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Phytophthora sp.</i> ¹⁹ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	2 per teeltcyclus	-	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	2 per teeltcyclus	3	-
	Grondbehandeling	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Phytophthora sp.</i> ¹⁹ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	2 per teeltcyclus	-	-
Potplanten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
	Aangieten/druppelen	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Phytophthora sp.</i> ¹⁹ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Snijbloemen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
	Grondbehandeling	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Phytophthora sp.</i> ¹⁹ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Snijbloemen (bedekte teelt, niet grondgebonden)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
		Echte meeldauw ²²				
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruining ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
	Grondbehandeling	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Phytophthora sp.</i> ¹⁹ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Boomkwekerijgewassen (pot- en containerteelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruining ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
	Aangietbehandeling	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Phytophthora sp.</i> ¹⁹ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Laanbomen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
		Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²				
Klimplanten	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Sierheesters	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Bos- en haagplantsoen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Vruchtbomen- en struiken	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
		Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²				
Vaste plantenteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
	Grondbehandeling	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Phytophthora sp.</i> ¹⁹ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Bloemenzaadteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Veredelingssteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen,	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruinig ¹²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
kruiden en sierteeltgewassen m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt		Echte meeldauw ²²				
	Grondbehandeling	<i>Pythium sp.</i> ¹⁸ <i>Phytophthora sp.</i> ¹⁹ <i>Rhizoctonia sp.</i> ²⁰	0,37 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Gazon	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Speelweide	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Grasbermen	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Windsingels en -schermen en -hagen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Kruidachtige beplanting	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Sclerotienrot ⁵ Loofverbruinig ¹² Echte meeldauw ²²	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-
Greens van golfterreinen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,37 kg/ha	12 per teeltcyclus	3	-

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
		Sclerotiënrot ⁵ Loofverbruining ¹² Echte meeldauw ¹				

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Dosering is afhankelijk van ziektedruk, gewashoogte en klimaatomstandigheden.

¹ Echte meeldauw (*Erysiphe graminis*)

² Bladvlekkenziekte (*Helminthosporium sp.*)

³ Oogvlekkenziekte (*Kabatiella zae*)

⁴ Grauwe Schimmel (*Botrytis cinerea* syn. *Botryotinea fuckeliana*)

⁵ Sclerotiënrot (*Sclerotiënrot sclerotiorum*)

⁶ Echte meeldauw (*Oidium lini*)

⁷ Echte meeldauw (*Erysiphe spp.*)

⁸ Spikkelziekte (*Alternaria brassicae*, *Alternaria brassicicola*)

⁹ Loofverbruining (*Alternaria dauci*)

¹⁰ Echte meeldauw (*Erysiphe cichoracearum*)

¹¹ Wortelrot (*Pythium sp.*)

¹² Loofverbruining (*Alternaria sp.*)

¹³ Tak- en bloesemsterfte (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*)

¹⁴ Echte meeldauw (*Sphaerotheca macularis*)

¹⁵ Echte meeldauw (*Sphaerotheca mors uvae*)

¹⁶ Echte meeldauw (*Uncinia necator*)

¹⁷ Echte meeldauw (*Oidium sp.*)

¹⁸ *Pythium spp.*

¹⁹ *Phytophthora spp.*

²⁰ *Rhizoctonia spp.*

²¹ Echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*)

²² Echte meeldauw (*Sphaerotheca spp.*, *Oïdium spp.*, *Erysiphe spp.*)

²³ Echte meeldauw (*Erysiphe betae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van hop het middel toepassen in 1000-4000 liter water per ha. In de teelt van druif het middel toepassen in 180-1000 liter water per ha.

In de teelt van aardbei, sla, courgette, komkommer, meloen, watermeloen en vruchtgroenten van Solanaceae het middel toepassen in 200-1000 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van spinazie-achtigen, wortelen, suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel, en yam voor grondbehandeling het middel toepassen in 1000-20000 L water/hectare

Roer het mengsel voortdurend tijdens toepassing. Gebruik de suspensie binnen enkele uren na mengen

Bevat *Bacillus amyloliquefaciens* stam FZB24. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Effecten op de fermentatie van druiven zijn niet beoordeeld.

In de teelt van granen het middel toepassen in het voorjaar, vanaf maart

Het middel in de teelt van erwten, bonen en wortelgewassen niet toepassen in walk-in tunnel