

Actueel WG van het middel **RootDei Biocontrol, 16825 N**

22 april 2025

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als fungicide voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardappel	Veurbehandeling	Rhizoctonia ¹	250 g / ha	1 per teeltcyclus	250 g / ha teeltcyclus	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Voederbiet	Veurbehandeling	Rhizoctonia ⁴	250 g / ha	1 per teeltcyclus	250 g / ha per teeltcyclus	-
Radijs (onbedekte teelt)	Veurbehandeling	Rhizoctonia ⁴	250 g / ha	1 per 12 maanden	250 g / ha per teeltcyclus	-
Rammenas (onbedekte teelt)	Veurbehandeling	Rhizoctonia ⁴	250 g / ha	1 per 12 maanden	250 g / ha per teeltcyclus	-
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)	Veurbehandeling	Rhizoctonia ⁴	250 g / ha	1 per 12 maanden	250 g / ha per teeltcyclus	-
Pastinaak (onbedekte teelt)	Veurbehandeling	Rhizoctonia ⁴	250 g / ha	1 per 12 maanden	250 g / ha per teeltcyclus	-
Knolraap (onbedekte teelt)	Veurbehandeling	Rhizoctonia ⁴	250 g / ha	1 per 12 maanden	250 g / ha per teeltcyclus	-
Koolraap (onbedekte teelt)	Veurbehandeling	Rhizoctonia ⁴	250 g / ha	1 per 12 maanden	250 g / ha per teeltcyclus	-
Sla; <i>Lactuca spp</i> (onbedekte teelt)	Veurbehandeling	Rhizoctonia ⁴	250 g / ha	1 per 12 maanden	250 g / ha per teeltcyclus	-
Schorseneer (onbedekte teelt)	Veurbehandeling	Rhizoctonia ⁴	250 g / ha	1 per 12 maanden	250 g / ha per teeltcyclus	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

⁴ Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van voederbiet, sla, radijs, rammenas, pastinaak, wortelpeterselie, knolraap, koolraap, schorseneer het middel toepassen in 150-250 L water / ha

Voeg het middel toe aan een kleine hoeveelheid water en meng goed. Voeg deze suspensie in de tank toe aan het totale benodigde volume water. Het middel bij voorkeur opslaan in een droge, koele vorstvrije plaats bij 4°C, bij deze temperatuur is het product 2 jaar houdbaar. De spuitvloeistof dient continu geroerd te worden.

Let op: De toepassingsmethodes zijn niet allemaal afzonderlijk getoetst. De werkzaamheid van een toepassingsschema dat de verschillende methodes combineert is aangetoond.

Bevat *Trichoderma asperellum* strain T34. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Gewasgevoeligheid

De veiligheid van het middel is gedemonstreerd op een beperkt aantal sierteeltsoorten en variëteiten. Hoewel schade aan andere soorten en variëteiten hoogstwaarschijnlijk niet zal voorkomen bij normaal gebruik, is het toch aan te raden om het product te testen op een klein aantal planten alvorens een groot aantal planten van een nieuwe variëteit te behandelen voor de eerste keer.