

15 april 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Sla m.u.v. veldsla (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹	1,5 L/ha	6 (2 per teeltcyclus)	10	7
Aubergine, paprika en tomaat (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot, wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Courgettes incl. patisson (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot, wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Komkommer (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot, wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Meloen (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot, wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Bolbloemen (bedekte teelt)	Dompelbehandeling**	Zachtrot, wortelrot ^{2,3}	0,3% (300 ml middel per 100 L water)	1	-	-

Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Potgrond behandeling	Voetrot, wortelrot ^{2,3}	300 ml middel in 10 L water per m ³ potgrond	1		
	Grondbehandeling na zaaien, stekken, verspenen of oppotten	Voetrot, wortelrot ^{2,3}	5-10 ml middel in 3-6 L water per m ²	2	14	-
	Aangietbehandeling in pot	Voetrot, wortelrot ^{2,3}	0,15% (150 ml middel per 100 L water); 100 ml per pot met diameter van 10-11 cm	1	-	-
	Druppelbehandeling (grond of substraat)	Voetrot, wortelrot ^{2,3}	1-2 L middel per ha (20.000 planten)	2	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** 20-30 minuten dompelen

¹ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

² Voetrot, wortelrot (*Pythium* spp.)

³ Voetrot, wortelrot (*Phytophthora* spp.)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
-------------------	-----------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	--------------------------------

Witlof (trekteelt)	Kraagbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	15 ml/m ²	1 per 12 maanden	-	21
	Toevoegen aan proceswater		0,029% (29 ml/100L water)	1 per 12 maanden		
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Wortelrot ^{2,3} , Stengelbasisrot ⁴ , Roodwortelrot ⁵	0,3% (300 ml middel per 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-
	Aangietbehandeling		0,15% (150 ml middel per 100 L water); 4,425 L middel per ha	1 per 12 maanden	-	-
	Druppelbehandeling		2 L/ha	4 per 12 maanden	7	-
	Gewasbehandeling		1,5 L/ha	10 per 12 maanden	10	-
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3} , Stengelbasisrot ⁴ , Roodwortelrot ⁵	1,5 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-
	Gewasbehandeling		1,5 L/ha	6 per 12 maanden	10	-
Augurk (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Wortelrot ²	1-2 L/ha	4 per 12 maanden	7	3
Pompoenachtigen en watermeloen (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Wortelrot ²	1-2 L/ha	4 per 12 maanden	7	3
Sluitkoolachtigen (bedekte opkweek)	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	26,3 L/ha	2 per 12 maanden	7	-

Bloemkoolachtigen (bedekte opkweek)	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	26,3 L/ha	2 per 12 maanden	7	-
Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	0,3% (300 ml middel per 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-
Knolbloemen (bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	0,3% (300 ml middel per 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	Toevoegen aan proceswater	Voetrot, wortelrot ^{2,3}	0,035% (35 ml/100L water)	1 per 12 maanden	-	-
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, niet- grondgebonden teelt)	Potgrond behandeling	Wortelrot ^{2,3}	300 ml middel in 10 L water per m ³	1 per 12 maanden	-	-
	Grondbehandeling na zaaien, stekken, verspenen of oppotten		5-10 ml middel in 3-6 L water per m ²	2 per 12 maanden	14	
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, grondgebonden teelt)	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	2,2 L/ha	1	-	-
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁶ Taksterfte ⁷	1,5 L/ha	10 per 12 maanden	10	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte containerteelt)	Druppel of aangietbehandeling	Valse meeldauw ⁶ Taksterfte ⁷	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁶ Taksterfte ⁷	1,5 L/ha	10 per 12 maanden	10	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	0,15% (150 ml middel per 100 L water), 100 ml per pot met diameter van 10- 11 cm**	1 per 12 maanden	-	-

	Druppelbehandeling		1-2 L/ha	4 per 12 maanden	7	-
	Grondbehandeling na zaaien, stekken, verspenen of oppotten		5-10 ml middel in 3-6 L water per m ²	2 per 12 maanden	14	
Veredeling en zaadteelt van groente-, fruit-, kruiden-, sierteelt- en akkerbouwgewassen m.u.v. aardappel, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁶ , Taksterfte ⁷	1,5 L/ha	6 per 12 maanden	10	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Dit komt overeen met 0,5 L (pot)grond

² Voetrot, wortelrot (*Pythium* spp.)

³ Voetrot, wortelrot (*Phytophthora* spp.)

⁴ Stengelbasisrot (*Phytophthora cactorum*)

⁵ Roodwortelrot (*Phytophthora fragariae*)

⁶ Valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

⁷ Taksterfte (*Phytophthora* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van sla, en de gewasbehandeling in de teelt van bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen het middel toepassen in 400-1500 L water/ha.

In de teelt van aardbei, paprika, tomaat, aubergine, augurk, komkommer, courgette, pattison, pompoenachtigen, meloen en watermeloen (druppelbehandeling), het middel toepassen in 500-1500 L water/ha.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.