

4 februari 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> – eetbare schil (bedekte substraatteelt)	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	Wortelrot ¹	1 L/ha**	1	10 L/ha	7 – 28***	3
			3 L/ha	3			
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte substraatteelt)	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	Wortelrot ¹	3 L/ha	4	12 L/ha	7 – 28***	3

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen;

** In verband met de kans op fytotoxiciteit in de eerste 10 dagen na het uitplanten maximaal 1 liter per hectare gebruiken;

*** Tussen de eerste toepassing (1 L/ha) en tweede toepassing (3 L/ha) een minimum interval van 7 dagen en tussen de latere toepassingen (3 L/ha) een minimum interval van 28 dagen.

¹ Wortelrot (*Pythium* spp.)

Het gebruik in de opkweek van sluitkoolachtigen en bloemkoolachtigen, en in de teelt van aromatische kruidgewassen is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt

daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

en

Het gebruik in de teelt van rozen, zaadteelt van lijsterbes en van bloemisterijgewassen, de veredelingsteelt en bedekte zaadteelt van overige akkerbouw- groenten- en bloemisterijgewassen is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

en

Het gebruik in de teelt van spinazie, aardbei (opkweek & vermeerderingsteelt), bloemisterijgewassen, klimplanten, rozen, sierheesters, heidesoorten en de vaste plantenteelt, de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen en de bedekte teelt van witlof (trekteelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae - niet- eetbare schil, vruchtgroenten van Cucurbitaceae – eetbare schil, aubergine, tomaat, radijs, bloembollen en bloemknollen, bolbloemen en knolbloemen, potplanten, snijbloemen, trekheesters, snijgroen, laanbomen, coniferen, kerstbomen, bos- en haagplantsoen en vruchtbomen en -struiken is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Spinazie (onbedekte teelt)	Aangietbehandeling of Grondbehandeling	Wortelrot ¹	2,5 L/ha	2,5 L/ha	1 per 12 maanden	2,5 L/ha per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Wortelrot ⁴ Stengelbasisrot ⁸ Roodwortelrot ⁹	0,3% (300 ml/100 L water)	0,3% (300 ml/100 L water)	1 per teeltcyclus	3 L/ha per 12 maanden	-	-
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	Wortelrot ⁴ Stengelbasisrot ⁸ Roodwortelrot ⁹	0,08% (80 ml/100 L water)	2,36 L/ha	1 per teeltcyclus		-	-
	Gewasbehandeling	Stengelbasisrot ⁸ Roodwortelrot ⁹	1,5 l/ha	1,5 L/ha	2 per 12 maanden		7	
Witlof (trekteelt)	Kraagbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	20 ml/m ²	20 ml/m ²	1 per 12 maanden	-	-	21
	Toevoegen aan proces water	Wortelrot ^{1,4}	0,04% (40 ml per 100 L water)	0,04% (40 ml per 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-	21
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> – niet- eetbare schil (bedekte substraatteelt)	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	Wortelrot ¹	1 L/ha**	1 L/ha**	1 per 12 maanden	10 L/ha per 12 maanden	7 – 28***	3
			3 L/ha	3 L/ha	3 per 12 maanden			
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> – eetbare schil (bedekte, niet grond- gebondenteelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹¹	0,17% (170 ml per 100 L water)	2,5 L/ha	2 per teeltcyclus	5 L/ha per teeltcyclus	7	3
Aubergine (bedekte, niet grond- gebondenteelt)	Gewasbehandeling	Phytophthora ¹²	0,17% (170 ml per 100 L water)	2,5 L/ha	2 per teeltcyclus	5 L/ha per teeltcyclus	7	3

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Tomaat (bedekte niet- grondgebonden teelt)	Gewasbehandeling	Phytophthora ¹²	0,17% (170 ml per 100 L water)	2,5 L/ha	2 per teeltcyclus	5 L/ha per teeltcyclus	7	3
Sluitkoolachtigen (bedekte opkweek)	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	7	-
Bloemkoolachtigen (bedekte opkweek)	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	7	-
Radijs (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ²	2,5 L/ha	2,5 L/ha	2 per teeltcyclus	25 L/ha per 12 maanden	7	14
Aromatische kruidgewassen	Gewasbehandeling	Wortelrot ¹ Valse meeldauw ⁵	2,5 L/ha	2,5 L/ha	2 per teeltcyclus	5 L/ha per teeltcyclus	15	21
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp, lelie en grobollige narcis (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Wortelrot ¹	0,3% (300 ml/100 L water)	0,3% (300 ml/100 L water)	1 per 12 maanden	-	-	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp, lelie (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Phytophthora ¹⁰	1,5 L/ha	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	1,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en grofbollige narcis (bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Wortelrot ¹	0,3% (300 ml in 100 L water)	0,3% (300 ml in 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Lelie (bedekte teelt)	Dompelbehandeling,	Wortelrot ¹	0,125% (125 ml in 100 L water)	0,125% (125 ml in 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-	-
Narcis (bedekte teelt)	Dompelbehandeling,	Wortelrot ¹	0,125% (125 ml in 100 L water)	0,125% (125 ml in 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-	-
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Potgrond behandeling	Wortelrot ¹	180 ml/m ³ pot grond	108 L/ha	1 per 12 maanden, of:	108 L/ha per 12 maanden	-	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ¹	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden		56	-
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, grond gebonden teelt)	Aangietbehandeling	Wortelrot ¹	3 L/ha	3 L/ha	1 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-	-
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	Toevoegen aan proces water	Wortelrot ¹	0,04% (40 ml per 100 L water)	0,04% (40 ml per 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-	-
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Zaadbehandeling	Kiem- en bodemschimmels ⁶	15 ml/kg mengsel zaad + zand	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden		-
Bloemisterijgewassen (bedekte grond gebonden teelt)	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	1,5 l/ha	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
Potplanten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Druppelbehandeling, aangietbehandeling of via eb/vloed systeem	Wortelrot ¹	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	-
Snijbloemen (bedekte, teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
Snijbloemen (bedekte, substraatteelt)	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/ha	3 L/ha	4 per 12 maanden	12 L/ha per 12 maanden	7 – 28***	-
Trekheesters (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	-
Snijgroen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	
Laanbomen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	
Klimplanten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	
Klimplanten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	1,5 l/ha	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
Rozen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	
Rozen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	1,5 l/ha	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Coniferen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Tak phytophthora ⁷	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	
Sierheesters (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	
Sierheesters (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	1,5 l/ha	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
Kerstbomen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Tak phytophthora ⁷	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	
Heide soorten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Phytophthora ¹⁰	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Heide soorten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Phytophthora ¹⁰	1,5 l/ha	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
Bos- en haagplantsoen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	
Vruchtbomen en - struiken (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{1,4}	3 L/1000 m ²	30 L/ha	2 per 12 maanden	60 L/ha per 12 maanden	56	
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	1,5 l/ha	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-
Lijsterbes (bedekte teelt)	Zaadbehandeling	Kiem- en bodemschimmels ⁶	15 ml/kg mengsel zaad + zand	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw, groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteelt gewassen	Gewasbehandeling	Kiem- en bodemschimmels ⁶ Valse meeldauw ⁵	0,15% (150 ml middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	2 per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** In verband met de kans op fytotoxiciteit in de eerste 10 dagen na het uitplanten maximaal 1 liter per hectare gebruiken;

*** Tussen de eerste toepassing (1 L/ha) en tweede toepassing (3 L/ha) een minimum interval van 7 dagen en tussen de latere toepassingen (3 L/ha) een minimum interval van 28 dagen.

¹ Wortelrot (*Pythium* spp)

² Valse meeldauw (*Peronospora parasitica*/*Hyaloperonospora parasitica*)

³ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

⁴ Wortelrot (*Phytophthora* spp)

⁵ Valse meeldauw (*Peronospora* spp)

⁶ Kiem- en bodemschimmels (*Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp.)

⁷ Tak phytophthora (*Phytophthora cinnamomi*)

⁸ Stengelbasisrot (*Phytophthora cactorum*)

⁹ Roodwortelrot (*Phytophthora fragariae*)

¹⁰ Phytophthora (*Phytophthora*
spp)

¹¹ Valse meeldauw (*Pseudoperonospora cubensis*)

¹² Phytophthora (*Phytophthora infestans*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de onbedekte teelt (aangietbehandeling) van spinazie, het middel toepassen in 5.000 liter water per ha.

In de onbedekte teelt (grondbehandeling) van spinazie, het middel toepassen in 500 tot 1.000 liter water per ha.

In de bedekte teelt (gewasbehandeling) van tomaat, aubergine en Vruchtgroenten van Cucurbitaceae (eetbare schil), het middel toepassen in 500 tot 1500 liter water per ha.

In de bedekte teelt (druppelbehandeling of aangietbehandeling) van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en de vaste plantenteelt, het middel toepassen in 20.000 liter water per ha.

In de teelt (gewasbehandeling) van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en de vaste planten het middel toepassen in 500-1000 liter water per ha.

In geval van dompelbehandeling: Draag handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen propamocarb en fosetyl. Propamocarb behoort tot de groep carbamaten. De Frac code is 28. Fosetyl-Al behoort tot de groep fosfonaten. De Frac code is P07. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.