

3 september 2025

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 -0,5 L/ha**	4		7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door Plantum. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (vermeerderingsveld en wachtbedden; onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Vlas (vezelgewassen) (onbedekte teelt)	Voor opkomst, na het zaaien	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-
Knolraap (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Koolraap (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Rode biet (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Mierikswortel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Boomkwekerijgewassen (pot- en containerteelt) (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Laanbomen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
	Na opkomst		0,85 L/ha	1	1 L/ha	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)		Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Heide soorten (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Vaste plantenteelt (niet grondgebonden, onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Voor opkomst, na het zaaien of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras (onbedekte teelt)	Voor opkomst, na het zaaien of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1	1 L/ha	-
			0,25 – 0,5 L/ha**	4		7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bieten, vlas en vaste plantenteelt het middel toepassen in 150 tot 600 liter water per ha.

In de teelt van knolraap, koolraap, rode biet, knolselderij en mierikswortel het middel toepassen voor BBCH 40 (Ontwikkeling van oogstbare vegetatieve plantendelen).

Het middel niet toepassen in de teelt van baby leaves.

Behandelde vlas niet voor menselijke en/of dierlijke consumptie bestemmen.

Gewasveiligheid

Let op: Het wordt afgeraden dit product toe te passen op zeer lichte zandgronden.

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof lenacil. Lenacil behoort tot de Uracil-verbindingen, de HRAC code is 5. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.