

20 maart 2015

ASTRIX EC, toelatingnummer 9390 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1 l/ha ¹	8 per teeltcyclus	6 l/ha	7
			6 l/ha	1 per teeltcyclus		-
			3 l/ha ²	2 per teeltcyclus		10
			3 l/ha ³	2 per teeltcyclus		10
Aardbei (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	6 l/ha	1 per teeltcyclus	6 l/ha	-
Spinazie (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha	-
Rode biet	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	4-6 l/ha	1 per teeltcyclus	6 l/ha	-
			3 l/ha ²	1 per teeltcyclus		-
Iris (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	6 l/ha	1 per teeltcyclus	6 l/ha	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Boomkwekerijgewassen (gezaaid) (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	6 l/ha	1 per 12 maanden	6 l/ha	-
Bloemenzaadteelt van Amaranthus, Lavatera, Mesembryanthum en Phlox drummondii (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	3-6 l/ha	1 per 12 maanden	6 l/ha	-

¹ in LDS-systeem met toegelaten middelen

² in combinatie met 1,5 l/ha metamitron (700 g/l) of 1,5 kg/ha metamitron (70%)

³ in combinatie met 1,5 l/ha ethofumesaat (200 g/l) of 0,6 l/ha ethofumesaat (500 g/l)

Dit middel dient voor de hierboven genoemde toepassingen verspoten te worden in 200-400 liter water per ha.

Het gebruik in de teelt van dahlia, knolbegonia, anemoon, afrikaantjes en rozen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Dahlia, knolbegonia, anemoon (onbedekte	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	2	4 l/ha	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
teelt)						
Afrikaantjes (tagetes)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	2	4 l/ha	7
Rozen (onbedekte teelt)	Over het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	3 l/ha	2	6 l/ha	7

Voor dahlia, knolbegonia, anemoon en rozen geldt dat dit middel verspoten dient te worden in 200-500 liter water per ha; in afrikaantjes dient 200-400 liter water per ha toegepast te worden.

Toepassingsvoorwaarden

Dit middel mag niet handmatig worden toegepast.

Spuitvloeistof continu in beweging houden.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van de enkelvoudige dosering van 6 l/ha (60 ml/are) in suiker- en voederbieten, rode bieten, aardbeien, boomkwekerijgewassen, bloemenzaadteelt of irissen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van 3 l/ha in combinatie met ethofumesaat of metamitron in suiker-, voeder- of rode bieten op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

In aardbeien dient dit middel toegepast worden 14-21 dagen na het uitplanten (zodra de planten goed zijn aangeslagen) tot het verschijnen van de eerste bloemknoppen.

In spinazie kan de toepassing enige gewasschade en opbrengstderving veroorzaken.

In boomkwekerijgewassen en in de bloemenzaadteelt van *Amaranthus* en *Phlox drummondii* kan de toepassing tijdelijke groeiremming veroorzaken.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof fenmedifam. Fenmedifam behoort tot de fenylcarbamaten. De Hrac code is C1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.