

Naam middel: Neudosan Contact

W.1

Toelatingsnummer: 16704 N

17 juni 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als mijten- en insectenbestrijdingsmiddel voor het voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 juni Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Peulvruchten	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5 per teeltcyclus	5
Pitvruchten (onbedekte teelt)	Bladluizen ² Bladvlo ⁴ Spintmijten ⁵	14 L/ha	14 L/ha	5 per 12 maanden	5
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	14 L/ha	14 L/ha	5 per 12 maanden	5
Bessen (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	10 L/ha	3 per 12 maanden	5
Bladgroenten**	Bladluizen ³	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5 per teeltcyclus	5
Vruchtgroenten (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵	2% (2 L/100 L water)	27 L/ha	5 per teeltcyclus	5
Vruchtgroenten** (bedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵ Wittevliegen ⁶	2% (2 L/100 L water)	36 L/ha	5 per teeltcyclus	5
Koolgewassen m.u.v. spruitkool (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5 per teeltcyclus	5

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Spruitkool (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	27 L/ha	5 per teeltcyclus	5
Koolgewassen** (bedekte teelt)	Bladluizen ¹ Wittevliegen ⁶	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5 per teeltcyclus	5
Wortel- en knolgewassen (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5 per teeltcyclus	5
Wortel- en knolgewassen** (bedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5 per teeltcyclus	5
Ui-achtigen (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5 per teeltcyclus	5
Stengelgroenten**	Bladluizen ³	2% (2 L/100 L water)	27 L/ha	5 per teeltcyclus	5
Kruidenteelt, vers en gedroogd (bedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5 per 12 maanden	5
Sierteeltgewassen (bedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵ Wittevliegen ⁶	2% (2 L/100 L water)	36 L/ha	5 per teeltcyclus	5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Inclusief zaailingproductie voor groenten bedoeld voor de bedekte teelt.

¹ Bladluis (*Aphididae*)

² Bladluis (*Aphididae*) m.u.v. appelbloedluis (*Eriosoma lanigerum*)

³ Bladluis (*Aphididae*) m.u.v. groene slaluis (*Nasonovia ribisnigri*)

⁴ Bladvlo (*Psylla* spp.)

⁵ Spintmijten (*Tetranychus* spp.)

⁶ Wittevliegen (*Aleyrodidae*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een

proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardappelen (onbedekte teelt)	Bonespintmijt ⁷	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Consumptieaardappel (bedekte teelt)	Bonespintmijt ⁷	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Voederbiet	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Winterrogge	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Triticale	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Spelt	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Kanariezaad (kanariegras)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Zomerrogge	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Haver	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Italiaans raaigras	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Frans raaigras	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Westerwolds raaigras	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Gekruist raaigras	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Zwenkgras	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Beemdgras	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Timothee, kropaar, struisgras, kamgras, ruwe smele, fakkelsgras	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Oliehoudende zaden	Bladluizen ¹ Koolzaadglans kever ⁸	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Vezelgewassen	Trips ⁹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Vlinderbloemige groenbemesters	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Voedergewassen	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Witlof (pennenteelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Cichorei	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Boekweit	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Meekrap	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Miscanthus	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Olifantsgras	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Quinoa	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Wede	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Wouw	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Sorghum	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Teff	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Gierst	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Russische paardenbloem	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Graszodenteelt	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Steenvruchten (bedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵	2% (2 L/100 L water)	14 L/ha	5	5
Aardbei	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵ Wittevliegen ⁶	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Bessen (bedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Druif (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	10 L/ha	5	5
Braam- en framboosachtigen (<i>Rubus</i> spp.) (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	10 L/ha	5	5

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Braam- en framboosachtigen (<i>Rubus</i> spp.) (bedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Noten (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	14 L/ha	5	5
Vijg (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	14 L/ha	5	5
Kiwi (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	14 L/ha	5	5
Boon met peul (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Boon zonder peul (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Kruiden, vers en gedroogd (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Laanbomen (spillen) (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Klimplanten	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
(onbedekte teelt)					
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Heidesoorten (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Vruchtbomen en - struiken (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ Spintmijten ⁵	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Gazon	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5
Speelweide	Bladluizen ¹	2% (2 L/100 L water)	18 L/ha	5	5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Bladluis (Aphididae)

⁵ Spintmijten (*Tetranychus* spp.)

⁶ Wittevlieg (*Aleyrodidae*)

⁷ Bonespintmijt (*Tetranychus urticae*)

⁸ Koolzaadglanskever (*Meligethes aeneus*)

⁹ Trips (*Thrips* spp.)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in de bedekte teelt van tulp, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er zijn voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Maximaal aantal liter middel per toepassing ha per 12 maanden
Tulpen (bedekte teelt)**	Bolbehandeling Dompelen	Tulpengalmijt ¹⁰	1% (1 L middel per 100 L water)	6,5 L/ha	1 per teeltcyclus, 5 per 12 maanden	32,5 L/ha
	Bolbehandeling Schuimen		1% (0,65 L middel per 1000 kg bollen)			

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Behandelde tulpenbollen mogen niet in open lucht worden uitgeplant.

¹⁰ Tulpengalmijt (*Aceria tulipae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Voeg anti-schuim middel toe.

Het product roeren tijdens gebruik.

Bij grote verpakkingen (> 20L), het product vóór gebruik effectief mengen met geschikte mengapparatuur of homogenisatoren.

In de teelt van pitvruchten en steenvruchten het middel toepassen in 300-700 liter water per ha.

In de teelt van kropvormende sla het middel toepassen tot begin kropvorming (BBCH 41).

Voor zilte teelten (lamsoor, zeekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van bladgroenten, vruchtgroenten, koolgewassen, wortel- en knolgewassen, ui-achtigen, stengelgroenten, voederbiet, winterrogge, triticale, spelt, kanariezaad, zomerrogge, haver, Italiaans raaigras, Frans raaigras, Westerwolds raaigras, gekruist raaigras, zwenkgras, beemdgras, overige grassen, oliehoudende zaden, vezelgewassen, vlinderbloemige groenbemesters, klaver, alfalfa, voederwikke, lupine, hanekam,

esparcette, veldboon (voedergewas), stoppelknol, witlof (pennenteelt), cichorei, boekweit, meekrap, miscanthus, olifantsgras, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff, gierst, Russische paardenbloem, graszodenteelt, boon met peul, boon zonder peul, erwt met peul, erwt zonder peul, kruidenteelt, bloembol- en bloemknolgewassen (m.u.v. lelie en tulp), bloemisterijgewassen, klimplanten, sierheesters (incl. rozen), coniferen (incl. kerstbomen), heidesoorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken, vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt, gazon en speelweide, op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van aardappelen en aardbei, op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of het laatste gewas in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van bessen, druif, braam- en framboosachtigen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste struikrij of de laatste struik in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van pitvruchten, steenvruchten, noten, vijg en kiwi op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van spullen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 500 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u dit middel op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Let op: in bedekte teelten kan er schade optreden bij blootstelling aan zonlicht.