

31 juli 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wintergraan m.u.v. winterrogge en kanariezaad	Voor of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15-0,20 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-
Witlof (pennenteelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,04-0,2 L/ha	0,2 L/ha	3 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	6
Cichorei	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,04-0,2 L/ha	0,2 L/ha	3 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	6
Voedergrasland	Voor of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per 12 maanden	0,1 L/ha per 12 maanden	-
Appel (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook ¹	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-
Peer (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook ¹	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Uien (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-
Sjalotten (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-
Prei (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per teeltcyclus	0,3 L/ha per teeltcyclus	-
Grasvegetatie	Voor of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per 12 maanden	0,1 L/ha per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Bespuiting alleen op de (zwart)strook. De hoeveelheid is de totale dosering die per “behandeld oppervlak” ((zwart)strook) toegepast mag worden, waarbij het behandelde oppervlak een percentage is van het totale perceel.

² Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

Het gebruik in de teelt van zwenkgras, beemdgras, vezelgewassen, vlinderbloemige groenbemesters, rogge, Japanse haver, facelia, spurrie, afrikaantjes, raketblad, sudangras, dederd, bladrap, zwaardherik, niger, klaver, meekrap, miscanthus, olifantsgras, Russische paardenbloem, graszodenteelt, kweeper, mispel, steenvruchten, knoflook, asperge, rabarber, zaaiprei, lelie, bloemisterijgewassen, coniferen en kerstbomen, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de onbedekte teelt van haver, raaigras m.u.v. Engels raaigras, Timothee, Kropaar, Struisgras, Kamgras, Ruwe smele, Fakkелgras, Festulolium, oliehoudende zaden, klein fruit, noten, boon zonder peul, erwten zonder peul, courgette, augurk, pompoen, suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel, yam, bosui, aromatische kruidgewassen, aromatische wortelgewassen, medicinale kruidgewassen, medicinale wortelgewassen, vruchten of bessen (kruidenteelt), bloembol- en bloemknolgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt en veredelingssteelt en basiszaadproductie is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Haver	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15-0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	-
Raaigras m.u.v. Engels raaigras	Direct na zaaien	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Zwenkgras	Voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 l/ha per 12 maanden	-	-
Beemdgras	Voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Timothee, Kropaar, Struisgras, Kamgras, Ruwe smele, Fakkелgras, Festulolium	Direct na zaaien	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Oliehoudende zaden	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per teeltcyclus	0,1 L/ha per teeltcyclus	-	-
Vezelgewassen	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	
Vlinderbloemige groenbemesters	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per teeltcyclus	0,1 L/ha per teeltcyclus	-	
Rogge, Japanse haver (grasachtige groenbemesters)	Voor of na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	
Facelia, Spurrie, Afrikaantjes, Raketblad, Sudangras, Deder, Bladraap, Zwaardherik, Niger (groenbemesters)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	
Klaver (voedergewassen)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per 12 maanden	0,1 L/ha per 12 maanden	-	-
Meekrap	Tijdens vegetatieve rustperiode	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Miscanthus	Tijdens vegetatieve rustperiode	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Olifantsgras	Tijdens vegetatieve rustperiode	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Russische Paardenbloem (rubberwinning)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,04 – 0,2 L/ha	0,2 L/ha	3 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	6	-
Graszodenteelt	Voor of na opkomst	Voor of na opkomst	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per 12 maanden	0,1 L/ha per 12 maanden	-	
Kweeper (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook ¹	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	
Mispel (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook ¹	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook ¹	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	
Aardbei (onbedekte teelt)	1-3 weken na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,3-0,4 L/ha	0,4 L/ha	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Klein fruit m.u.v. aardbei (onbedekte teelt)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	100

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Noten (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook ¹	0,3 L/ha ²	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden		
Boon zonder peul (onbedekte teelt)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per teeltcyclus	0,1 L/ha per teeltcyclus	-	
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per teeltcyclus	0,1 L/ha per teeltcyclus	-	
Augurk (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	
Courgette (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	
Pompoen-achtigen (onbedekte teelt)	Na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	90
Suikerwortel (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Pastinaak (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Aardpeer (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Japanse aardappel (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Zoete aardappel (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Rode biet (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Schorseneer (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Mierikswortel (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Yam (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Eerstejaars Plantui (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	7	
Tweedejaars Plantui (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	7	
Zilverui (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	7	
Picklers (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	7	
Sjalotten (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	7	
Bosui (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	-
Knoflook (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
	Na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus		7	-
Asperge (onbedekte teelt)	Na oogst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 L/ha	0,25 L/ha	1 per 12 maanden	0,25 L/ha per 12 maanden	-	-
Rabarber (onbedekte teelt)	Tijdens vegetatieve rustperiode	eenjarige breedbladige onkruiden	0,4 L/ha	0,4 L/ha	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Prei (onbedekte teelt)	Na zaaien	eenjarige breedbladige onkruiden	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per teeltcyclus	0,3 L/ha per teeltcyclus	-	-
			0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus		7	-
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst / na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	30
Aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst / na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst / na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst / na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. de vermeerderingsteelt van tulp en lelie (onbedekte teelt)	Na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per 12 maanden	0,2 L/ha per 12 maanden	-	-
Lelie m.u.v. de tweedejaarsteelt (onbedekte teelt)	Na planten, voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Voor opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per 12 maanden	0,2 L/ha per 12 maanden	-	-
Boomkwekerijgewassen m.u.v. coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1 L/ha ¹ zwartstrook	0,5 L/ha ²	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
			0,1-0,3 L/ha ¹ zwartstrook	0,15 L/ha ²	2 per 12 maanden		7	-
			0,1-0,2 L/ha ¹ zwartstrook	0,1 L/ha ²	4 per 12 maanden		7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Coniferen (onbedekte teelt)	Na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1 L/ha ¹ zwartstrook	0,5 L/ha ²	1 per 12 maanden	1 L/ha zwartstrook per 12 maanden		
Kerstbomen (onbedekte teelt)	Na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1 L/ha ¹ zwartstrook	0,5 L/ha ²	1 per 12 maanden	1 L/ha zwartstrook per 12 maanden	-	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1 L/ha ¹ zwartstrook	0,5 L/ha ²	1 per 12 maanden	1 L/ha zwartstrook per 12 maanden	-	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling na planten	eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per 12 maanden	0,2 L/ha per 12 maanden	-	-
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	na planten of na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per 12 maanden	0,2 L/ha per 12 maanden	-	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Bespuiting alleen op de (zwart)strook. De hoeveelheid is de totale dosering die per “behandeld oppervlak” ((zwart)strook) toegepast mag worden, waarbij het behandelde oppervlak een percentage is van het totale perceel.

² Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 100-400 liter water per ha.

Bijproducten van behandelde vezelgewassen, zoals lijnzaad, niet voor menselijke en/of dierlijke consumptie bestemmen.

Behandelde medicinale kruidgewassen en medicinale wortelgewassen alleen gebruiken voor homeopathische of medicinale doeleinden.

In de teelt van voedergrasland en grasvegetatie het middel toepassen voor het ontvouwen van het eerste blad (BBCH 11).

In de teelt van uien, sjalotten en knoflook het middel toepassen vanaf het uitplanten of het kiemhaakstadium (BBCH 9).

In de teelt van boon zonder peul en erwt zonder peul het middel toepassen tijdens het ontvouwen van het tweede tot vierde blad (BBCH 12-14).

In de teelt van augurk en courgette het middel toepassen bij het ontvouwen van het derde blad (BBCH 13).

De werkzaamheid in wintergranen kan sterk afnemen in geval van een watertekort. In grasvegetatie bij droogte de toepassing met het middel volgen met een bespuiting met water.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de teelt van boomkwekerijgewassen uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Na het mislukken van de teelt van wintergraan kan graan of gras worden ingezaaid. Als volggewas wordt de teelt van kruisbloemigen (koolgewassen, koolzaad) afgeraden.

In de teelt van coniferen en kerstbomen het middel alleen toepassen op goed bewortelde planten. Op zaaibedden in de boomkwekerij kan het middel niet worden toegepast.

Bij bloemisterijgewassen is er ervaring in een beperkt aantal soorten en cultivars. Om risico op fytoxiciteit te voorkomen wordt aangeraden altijd eerst een proefbespuiting uit te voeren in de betreffende soorten/cultivars.