

22 juli 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Veiligheidstermijn in dagen
Pitvruchten (onbedekte teelt)	rupsen ^{1,2,3,4,5,6}	0,05% (50 ml/100 L water)	0,6 L/ha	1 per 2 jaar	7
Kers (onbedekte teelt)	rupsen ^{3,5} vliegen en muggen ^{7,8}	0,05% (50 ml/100 L water)	0,75 L/ha	1 per 3 jaar	7
Pruim (onbedekte teelt)	rupsen ^{1,5,9}	0,05% (50 ml/100 L water)	0,6 L/ha	1 per 2 jaar	7
Wijndruif (onbedekte teelt)	rupsen ^{10,11} vliegen en muggen ⁷	0,05% (50 ml/100 L water)	0,73 L/ha	1 per 2 jaar	10

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ vruchtbladroller (*Adoxophyes orana*)

² bruinbandbladroller (*Argyrotaenia ljungiana*)

³ bladrollers (*Archips* spp.)

⁴ fruitmot (*Cydia pomonella*)

⁵ kleine wintervlinder (*Operophtera brumata*)

⁶ bladrollers (*Pandemis* spp.)

⁷ Suzuki-fruitvlieg (*Drosophila suzukii*)

⁸ Europese kersenboorvlieg (*Rhagoletis cerasi*)

⁹ pruimenmot (*Grapholita funebrana*, syn. *Cydia funebrana*)

¹⁰ druivenbladroller (*Lobesia botrana*)

¹¹ blauw smalsnuitje (*Eupoecilia ambiguella*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen	Veiligheidstermijn in dagen
Kers (onbedekte teelt)	rupsen ¹²	0,05% (50 ml/100 L water)	0,6 L/ha	1 per 2 jaar	7
Braam- en framboos-achtigen (onbedekte teelt)	vliegen en muggen ⁷	0,06% (60 ml/100 L water)	0,72 L/ha	1 per 2 jaar	3
Aalbes (onbedekte teelt)	vliegen en muggen ⁷	0,06% (60 ml/100 L water)	0,72 L/ha	1 per 2 jaar	3
Kruisbes (onbedekte teelt)	vliegen en muggen ⁷	0,06% (60 ml/100 L water)	0,72 L/ha	1 per 2 jaar	3
Blauwe bes (onbedekte teelt)	vliegen en muggen ⁷	0,06% (60 ml/100 L water)	0,72 L/ha	1 per 2 jaar	3
Rozenbottel (onbedekte teelt)	vliegen en muggen ⁷	0,06% (60 ml/100 L water)	0,72 L/ha	1 per 2 jaar	3
Kiwibes (onbedekte teelt)	vliegen en muggen ⁷	0,06% (60 ml/100 L water)	0,72 L/ha	1 per 2 jaar	3

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

⁷ Suzuki-fruitvlieg (*Drosophila suzukii*)

¹² Kersenbladroller (*Pandemis cerasana*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van pitvruchten het middel toepassen vanaf vruchtdiameter 10 mm (BBCH 71) tot en met vruchten plukrijp (BBCH 87).

In de teelt van kers tegen rupsen van bladrollers en wintervlinder (0,6 of 0,75 L/ha) het middel toepassen vanaf vruchtval na bloei (BBCH 71) tot en met vruchten plukrijp (BBCH 87).

In de teelt van kers tegen Suzuki-fruitvlieg en kersenboorvlieg (0,75 L/ha) het middel toepassen vanaf vruchtgrootte ongeveer 90% van finale grootte (BBCH 79) tot en met vruchten plukrijp (BBCH 87).

In de teelt van pruim het middel toepassen vanaf vruchtval na bloei (BBCH 71) tot en met vruchten plukrijp (BBCH 87).

In de teelt van wijndruif, braam- en framboos-achtigen aalbes, kruisbes, blauwe bes, rozenbottel en kiwibes het middel toepassen vanaf begin vergroten vruchtknoppen, resten van bloeiwijze gevallen (BBCH 71) tot en met vruchten oogstrijp (BBCH 85).

In de teelt van kers in een dosering van meer dan 0,6 L/ha tot aan 0,75 L/ha het middel toepassen van juli tot en met augustus.

In de teelt van wijndruif het middel toepassen van juli tot en met september.

In de teelt van braam- en framboos-achtigen, aalbes, kruisbes, blauwe bes, rozenbottel en kiwibes het middel toepassen van juni tot en met september.

In de teelt van steen- en pitvruchten uitsluitend toepassen met machinaal voortbewogen apparatuur.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de onbedekte teelt van pitvruchten, pruim, wijndruif, braam- en framboos-achtigen, aalbes, kruisbes, blauwe bes, rozenbottel en kiwibes op zijn vroegst in het 2e kalenderjaar na de laatste toepassing op hetzelfde perceel worden toegepast, waarbij in de tussenliggende periode ook geen andere middelen op basis van cyantraniliprole mogen worden toegepast.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel bij toepassing met een dosering tot en met 0,6 L/ha in de onbedekte teelt van kers op zijn vroegst in het 2e kalenderjaar na de laatste toepassing op hetzelfde perceel worden toegepast, waarbij in de tussenliggende periode ook geen andere middelen op basis van cyantraniliprole mogen worden toegepast.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel bij toepassing met een dosering groter dan 0,6 L/ha tot maximaal 0,75 L/ha in de onbedekte teelt van kers op zijn vroegst in het 3e kalenderjaar na de laatste toepassing op hetzelfde perceel worden toegepast, waarbij in de tussenliggende periode ook geen andere middelen op basis van cyantraniliprole mogen worden toegepast.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens), of,
- een techniek uit de klasse DRT97.5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens).

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof cyantraniliprole. Cyantraniliprole behoort tot de ryanodine receptor modulators. De IRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Het resistentierisico is hoog. Om resistentieontwikkeling te voorkomen, het middel afwisselen met middelen op basis van een andere actieve stof. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.