

27 mei 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, CTGB juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	30
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**				
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Bieten	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden, graanopslag	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	60
		Hanenpoot, duist ***	0,2 L/ha	2		14	
		Hanenpoot, duist	0,75-1 L/ha**	1		-	
		Raaigras	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Wilde haver***	0,4 L/ha	2		14	
		Wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Droog te oogsten erwten	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1		-	45

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Koolzaad (oliehoudende zaden)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	90
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Vlas (oliehoudende zaden)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	110
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Vlas (vezelgewassen)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	110
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
			1,5 L/ha	1		-	
Aardbei (onbedekte teelt)	Na planten	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per 12 maanden	-	35
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	40
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Sluitkool, broccoli (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	30
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Koolraap (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	30
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Wortelen, wortel-peterselie, pastinaak (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	30
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Uien, sjalotten, knoflook (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	30
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Tussen de rijen, zonder het gewas te raken	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per 12 maanden	-	30
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

**Lagere concentratie toepassen vóór uitstoeling van het onkruid, hogere concentratie tijdens uitstoeling

*** In LDS-systeem wanneer de bieten nog zeer jong zijn (1- tot 2-bladstadium)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Droog te oogsten bonen m.u.v. sojaboon	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 per teeltcyclus	-	45
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Blauwmaanzaad, mosterd	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 per teeltcyclus	-	90
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Hennep, brandnetel	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	-
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Groenbemesters (klaver, lupine, voederwikke, serradella, hanekam, esparcette, veldboon, koolzaad, blad- en mergkool, facelia, spurrie, tagetes, raketblad, dedert, bladrap, zwaardherik, niger)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	-
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Meekrap, wouw	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per teeltcyclus	-	-
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teelt-cyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bloemkool (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per 12 maanden	-	30
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
knolraap, aardpeer, knolselderij, schorseneer, mierikswortel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per 12 maanden	-	30
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per 12 maanden	-	-
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Laanbomen, Klimplanten, Coniferen en kerstbomen, Sierheester incl. rozen, Heide soorten, Bos- en haagplantsoen, Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Na opkomst / tussen het gewas (laanbomen)	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per 12 maanden	-	-
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teelt-cyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per 12 maanden	-	-
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,75-1 L/ha**	1	1,5 L/ha per 12 maanden	-	-
		Raaigras, wilde haver	1-1,2 L/ha**	1		-	
		Kweek	0,75 L/ha	2		14	
			1,5 L/ha	1		-	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

**Lagere concentratie toepassen vóór uitstoeling, hogere concentratie tijdens uitstoeling

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel niet toepassen in de teelt van baby leaves.

Het middel toepassen in 75-300 liter water per ha.

Per teelt mag maximaal 1,5 L/ha per 12 maanden worden toegepast.

In onbedekte teelten uitsluitend toepassen met machinaal voortbewogen apparatuur.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

In de teelt van bieten mogen lagere doses niet gebruikt worden op zware klei of wanneer er vermoedens bestaan omtrent het optreden van resistentie.

Agil 100 EC in bieten alleen toepassen in combinatie met andere toegelaten middelen.

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de teelt van laanbomen, klimplanten, coniferen en kerstbomen, sierheester incl. rozen, heide soorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken, vaste planten en bloemenzaad alleen toegestaan tussen BBCH 10 en 19 (bladontwikkeling van de hoofdscheut).

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten te beschermen, is toepassing in de teelt van bieten, droog te oogsten bonen m.u.v. sojaboon, droog te oogsten erwten, koolzaad, vlas, blauwmaanzaad, mosterd, hennep, brandnetel, groenbemesters (klaver, lupine, voederwikke, serradella, hanekam, esparcette, veldboon, koolzaad, blad- en mergkool, facelia, spurrie, tagetes, raketblad, dedert, bladrap, zwaardherik, niger), meekrap, wouw, erwt zonder peul, sluitkool, bloemkool, koolrap, wortelpeterselie, pastinaak, knolrap, aardpeer, knolselderij, schorseneer, mierikswortel en bloemenzaadteelt uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 cm gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten te beschermen, is toepassing in de teelt van hennep, uien, sjalotten, knoflook, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken en vaste plantenteelt uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 175 cm gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten te beschermen, is toepassing in de teelt van aardappelen, aardbei, broccoli, wortelen, bloemisterijgewassen, klimplanten, sierheesters (incl. rozen), coniferen (incl. kerstbomen) en heidesoorten uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 200 cm gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten en planten te beschermen, is toepassing in de teelt van appel, peer, kweeper en laanbomen uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek voor neerwaartse onkruidbestrijding in fruitteelt en boomteelt.

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof propaquizafop. Propaquizafop behoort tot de aryloxyphenoxy-propionaten. De HRAC code is 1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.