

26 augustus 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Aardbeien (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Stengelbasisrot ¹	0,25% (250 gram middel per 100 liter water)**	10 kg/ha	1	-	-
Aardbeien productieteelt (onbedekte teelt)	Rijenbehandeling	Stengelbasisrot ¹	7,5 kg/ha	7,5 kg/ha	1	-	14
		Roodwortelrot ²	7,5 kg/ha	7,5 kg/ha	3	28	14
Aardbeien, opkweek & vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Stengelbasisrot ¹ Roodwortelrot ²	7,5 kg/ha	7,5 kg/ha	1	-	-
Witlof (trekteelt)	Toevoegen aan proces water	Verslijming ³	0,03% (30 gram per 100 liter water)	10,5 g/m ² teeltoppervlak	1	-	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** De resterende dompelvloeistof mag uitsluitend worden verwerkt via een aangietbehandeling na het planten, max. 100 ml per plant.

¹ Stengelbasisrot (*Phytophthora cactorum*)

² Roodwortelrot (*Phytophthora fragariae*)

³ Verslijming (*Phytophthora erythroseptica*).

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Aardbeien, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹ Grauwe schimmel ²	7,5 kg/ha	7,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Sla; <i>Lactuca</i> spp (kas)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ³	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	4 per 12 maanden	10	14
Sla; <i>Lactuca</i> spp (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ³	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	10	14
Andijvie (kas)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ³	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	4 per 12 maanden	10	14
Andijvie (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ²	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	10	14

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
		Valse meeldauw ³					
Spinazie m.u.v. raapstelen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁴ Echte meeldauw ⁵	0,9 kg/ha	0,9 kg/ha	2 per 12 maanden	7	14
Sluitkoolachtigen (bedekte opkweek)	Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Bloemkoolachtigen (bedekte opkweek)	Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Radijs-achtigen (kas)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁸	0,9 kg/ha	0,9 kg/ha	2 per teeltcyclus 10 per 12 maanden	7	14
Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹⁴	3,5 kg/ha	3,5 kg/ha	3 per 12 maanden	14	14
Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹⁴	3,5 kg/ha	3,5 kg/ha	3 per 12 maanden	14	14
Zilverui (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹⁴	3,5 kg/ha	3,5 kg/ha	3 per 12 maanden	14	14
Picklers (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹⁴	3,5 kg/ha	3,5 kg/ha	3 per 12 maanden	14	14
Aromatische kruidgewassen (kas)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁹	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	4 per 12 maanden	10	14

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁹	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	10	14
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie, tulp en grofbollige narcis (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling of	Pythium ⁶	1,4% (1,4 kg/100 L water)	10,0 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	Plantvoorbehandeling of	Pythium ⁶	10,0 kg/ha	10,0 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	10	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en grofbollige narcis (kas)	Dompelbehandeling	Pythium ⁶	1,4% (1,4 kg/100 L water)	10,0 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Lelie (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur ¹²	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	10	-
Lelie (kas)	Dompelbehandeling	Pythium ⁶	0,6% (600 g/100 L water)	10,0 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Tulp (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur ¹³	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	10	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Narcis (kas)	Dompelbehandeling	Pythium ⁶	0,53% (533 g/100 L water)	10,0 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Bolbloemen en knolbloemen (niet-grondgebonden kas)	Aangietbehandeling	Pythium ⁶	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
	Potgrondbehandeling	Pythium ⁶	16,67 g/m ³ potgrond	10,0 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Bolbloemen en knolbloemen (grondgebonden kas)	Aangietbehandeling	Pythium ⁶	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Bolbloemen en knolbloemen (kas)	Toevoegen aan proceswater	Pythium ⁶	0,03% (30 gram middel per 100 liter)	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Potplanten (incl. perkplanten) (niet-grondgebonden kas)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Gauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	4 per 12 maanden	10	-
	Druppelbehandeling Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Snijbloemen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Gauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	10	-
Snijbloemen (grondgebonden kas)	Aangietbehandeling	Pythium ⁶	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Snijbloemen (niet-grondgebonden kas)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	4 per 12 maanden	10	-
	Druppelbehandeling Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Trekheesters (kas)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	4 per 12 maanden	10	-
	Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Trekheesters (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	10	-
	Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Snijgroen (kas)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ²	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	4 per 12 maanden	10	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
		Valse meeldauw ⁸					
	Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Snijgroen (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	10	-
	Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Boomkwekerijgewassen (kas)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	4 per 12 maanden	10	-
	Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Laanbomen (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,125 kg/ha	2,125 kg/ha	2 per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling of	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,3125 kg/1000m ²	3,125 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
	Plantvoorbehandeling	Pythium ⁶	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Klimplanten (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,125 kg/ha	2,125 kg/ha	2 per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,3125 kg/1000m ²	3,125 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,125 kg/ha	2,125 kg/ha	2 per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling of	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,3125 kg/1000m ²	3,125 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
	Plantvoorbehandeling	Pythium ⁶	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,125 kg/ha	2,125 kg/ha	2 per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling of	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,3125 kg/1000m ²	3,125 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
	Plantvoorbehandeling	Pythium ⁶	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Heide soorten (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,125 kg/ha	2,125 kg/ha	2 per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,3125 kg/1000m ²	3,125 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,125 kg/ha	2,125 kg/ha	2 per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling of	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,3125 kg/1000m ²	3,125 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
	Plantvoorbehandeling	Pythium ⁶	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-	-
Vruchtbomen en - struiken (onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,125 kg/ha	2,125 kg/ha	2 per 12 maanden	7	-
	Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,3125 kg/1000m ²	3,125 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Vaste plantenteelt (niet grondgebonden onbedekte teelt en walk-in tunnels)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	10	-
	Druppelbehandeling Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-
Vaste plantenteelt (niet grondgebonden kas)	Gewasbehandeling of	Echte meeldauw ^{1, 5, 10, 11} Grauwe schimmel ² Valse meeldauw ⁸	2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	4 per 12 maanden	10	-
	Druppelbehandeling Aangietbehandeling	Pythium ⁶ Phytophthora ⁷	0,75 kg/1000m ²	7,5 kg/ha	2 per 12 maanden	56	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Echte meeldauw (*Sphaerotheca* spp.)

² Grauwe schimmel (*Botrytis* spp.)

³ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

⁴ Valse meeldauw (*Peronospora farinosa* f. sp. *Spinaciae*)

⁵ Echte meeldauw (*Oidium* spp.)

⁶ Pythium (*Pythium* spp.)

⁷ Phytophthora (*Phytophthora* spp.)

⁸ Valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

⁹ Valse meeldauw (*Plasmopara* spp.)

¹⁰ Echte meeldauw (*Erysiphe* spp.)

¹¹ Echte meeldauw (*Microsphaera* spp.)

¹² Vuur (*Botrytis elliptica*)

¹³ Vuur (*Botrytis tulipae*)

¹⁴ Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

¹⁵ Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van sla (onbedekte teelten en walk-in tunnels), andijvie (onbedekte teelt en walk-in tunnels), spinazie (onbedekte teelt en walk-in-tunnels) en bloembollen en bloemknollen m.u.v. narcis (gewasbehandeling, onbedekte teelt) het middel toepassen in 500 tot 1000 liter water per ha.

In aardbeien, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekt), het middel maximaal 1 keer per 12 maanden toepassen.

Handmatig dompelen van aardbeienplanten, bloembollen en bloemknollen is niet toegestaan.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor van nature voorkomende of uitgezette natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling. Indien u natuurlijke vijanden heeft uitgezet: raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof fosetyl-aluminium. Fosetyl-aluminium behoort tot de groep fosfonaten. De Frac code is 33. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.