

23 december 2022

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel en middel voor de behandeling van stobben voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

| Toepassingsgebied                                                                                                                                           | Type toepassing                                       | Werkzaamheid getoetst op | Dosering* middel per toepassing | Maximale dosering middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Veiligheids termijn in dagen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Akkerbouwgewassen (onbedekte teelt)                                                                                                                         | Doodspuiten, voor het planten of zaaien van het gewas | Dekvruchten              | 2 - 3 L/ha <sup>1</sup>         | 3 L/ha                                  | 1 per 12 maanden                                               | 3 L/ha per 12 maanden                                                 | -                            |
| Akkerbouwgewassen, Cultuurgraslanden, Fruitgewassen, Groenteteelt, Kruidenteelt, Sierteeltgewassen (onbedekte teelt)                                        | Pleksgewijs spuiten <sup>5</sup>                      | Onkruiden                | 2% (200 ml in 10 liter water)   | 0,3 L/ha <sup>3</sup>                   | 1 per 12 maanden                                               | 0,3 L/ha per 12 maanden                                               | 30                           |
| Akkerbouwgewassen, Cultuurgraslanden, Fruitgewassen, Groenteteelt, Kruidenteelt, Sierteeltgewassen, Openbaar groen en particuliere tuinen (onbedekte teelt) | Pleksgewijs aanstrijken <sup>4</sup>                  | Onkruiden                | 33% (1000 ml in 2 liter water)  | 0,4 L/ha <sup>3</sup>                   | 1 per 12 maanden                                               | 0,4 L/ha                                                              | -                            |

|                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                              |                                        |                        |                   |                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|----|
| Akkerbouwgewassen<br>Cultuurgrasland<br>Fruitgewassen<br>Groenteteelt<br>Kruidenteelt<br>Sierteeltgewassen<br>(onbedekte teelt) | Doodspuiten                                                 | Gewassen uit<br>fyto-sanitaire<br>overweging op<br>aanwijzing van<br>de directeur van<br>NPPO van NVWA,<br>of rechtsopvolger | 2 – 3 L/ha <sup>1</sup>                | 3 L/ha                 | 1 per 12 maanden  | 3 L/ha per 12 maanden    | -  |
|                                                                                                                                 | Pleksgewijs spuiten                                         |                                                                                                                              | 2%<br>(200 ml in 10 liter water)       | 0,4 L/ha <sup>3</sup>  | 1 per 12 maanden  | 0,4 L/ha                 | -  |
| Aardappelen                                                                                                                     | Behandeling voor opkomst                                    | Onkruiden                                                                                                                    | 2 – 4,4 L/ha <sup>1</sup>              | 4,4 L/ha               | 1 per teeltcyclus | 4,4 L/ha per teeltcyclus | -  |
| Bieten                                                                                                                          | Behandeling voor opkomst                                    | Onkruiden                                                                                                                    | 2 – 4,4 L/ha <sup>1</sup>              | 4,4 L/ha               | 1 per teeltcyclus | 4,4 L/ha per teeltcyclus | -  |
|                                                                                                                                 | Pleksgewijs aanstrijken <sup>2</sup>                        | Aardappel-opslag                                                                                                             | 1%<br>(100 ml in 10 liter water)       | 0,4 L/ha <sup>3</sup>  | 1 per teeltcyclus | 0,4 L/ha per teeltcyclus | 60 |
| Droog te oogsten erwten                                                                                                         | Pleksgewijs spuiten; kort voor oogst                        | Onkruiden                                                                                                                    | 2%<br>(200 ml in 10 liter water)       | 0,44 L/ha <sup>3</sup> | 1 per teeltcyclus | 0,44 L/ha                | 7  |
| Droog te oogsten bonen                                                                                                          | Pleksgewijs spuiten; kort voor oogst                        | Onkruiden                                                                                                                    | 2%<br>(200 ml in 10 liter water)       | 0,44 L/ha <sup>3</sup> | 1 per teeltcyclus | 0,44 L/ha                | 7  |
| Groenbemesters                                                                                                                  | Behandeling over het gewas                                  | Groen-bemesters                                                                                                              | 2 - 3 L/ha <sup>1</sup>                | 3 L/ha                 | 1 per 12 maanden  | 3 L/ha per 12 maanden    | -  |
| Voedergrasland                                                                                                                  | Behandeling over het onkruid, voor het zaaien van het gewas | Onkruiden en gras                                                                                                            | 2 - 3 L/ha <sup>1</sup>                | 3 L/ha                 | 1 per 12 maanden  | 3 L/ha per 12 maanden    | -  |
| Fruitgewassen (onbedekte teelt)                                                                                                 | Pleksgewijs aanstrijken                                     | Stobben van bomen en struiken                                                                                                | 5%<br>(500 ml in 10 liter water)       | 2 L/ha <sup>3</sup>    | 1 per 12 maanden  | 2 L/ha per 12 maanden    | -  |
| Groot fruit (onbedekte teelt)                                                                                                   | Stroken-behandeling                                         | Onkruiden                                                                                                                    | 2 – 3 L/ha op zwartstrook <sup>1</sup> | 1,5 L/ha in boomgaard  | 1 per 12 maanden  | 1,5 L/ha per 12 maanden  | 28 |

|                                        |                             |             |                           |                     |                      |                             |   |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| Ui-achtigen<br>(onbedekte teelt)       | Behandeling<br>voor opkomst | Onkruiden   | 2 – 4,4 L/ha <sup>1</sup> | 4,4 L/ha            | 1 per<br>teeltcyclus | 4,4 L/ha per<br>teeltcyclus | - |
| Asperge<br>(onbedekte teelt)           | Behandeling<br>voor opkomst | Onkruiden   | 2 – 4,4 L/ha <sup>1</sup> | 4,4 L/ha            | 1 per<br>teeltcyclus | 4,4 L/ha per<br>teeltcyclus | - |
| Sierteeltgewassen<br>(onbedekte teelt) | Pleksgewijs                 | Stobben van | 5%                        | 2 L/ha <sup>3</sup> | 1 per 12             | 2,0 L/ha per                | - |

| Toepassingsgebied                                | Type toepassing                         | Werkzaamheid getoetst op           | Dosering* middel per toepassing | Maximale dosering middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Veiligheids termijn in dagen |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                  | aanstrijken                             | bomen en struiken                  | (500 ml in 10 liter water)      |                                         | maanden                                                        | 12 maanden                                                            |                              |
| Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt) | Behandeling voor opkomst                | Onkruiden                          | 2 – 4,4 L/ha <sup>1</sup>       | 4,4 L/ha                                | 1 per teeltcyclus                                              | 4,4 L/ha per teeltcyclus                                              | -                            |
|                                                  | Doodspuiten, voor planten van het gewas | Dekvruchten                        | 2 - 3 L/ha <sup>1</sup>         | 3 L/ha                                  | 1 per 12 maanden                                               | 3 L/ha per 12 maanden                                                 | -                            |
| Kerstbomen (onbedekte teelt)                     | Behandeling over het gewas              | Onkruiden                          | 2 – 3 L/ha <sup>1</sup>         | 3 L/ha                                  | 1 per teeltcyclus                                              | 3 L/ha per teeltcyclus                                                | -                            |
| Bosbouw                                          | Pleksgewijs spuiten                     | Amerikaanse vogelkers <sup>a</sup> | 1% (100 ml in 10 liter water)   | 0,4 L/ha <sup>3</sup>                   | 1 per 12 maanden                                               | 0,4 L/ha per 12 maanden                                               | -                            |
| Openbaar groen en particuliere tuinen            | Pleksgewijs aanstrijken                 | Stobben van bomen en struiken      | 5% (500 ml in 10 liter water)   | 2 L/ha <sup>3</sup>                     | 1 per 12 maanden                                               | 2,0 L/ha per 12 maanden                                               | -                            |
| Onbeteeld terrein                                | Pleksgewijs aanstrijken                 | Stobben van bomen en struiken      | 5% (500 ml in 10 liter water)   | 2 L/ha <sup>3</sup>                     | 1 per 2 maanden                                                | 2,0 L/ha per 12 maanden                                               | -                            |
| Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akkerranden   | Spuiten over het onkruid                | Onkruiden                          | 2 – 3 L/ha <sup>1</sup>         | 3 L/ha                                  | 1 per 12 maanden                                               | 3 L/ha per teeltcyclus                                                | -                            |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>a</sup> Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*)

<sup>1</sup> Dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid

<sup>2</sup> Bestrijding van aardappelopslag dient alleen plaats te vinden wanneer gebruik gemaakt wordt van speciaal voor dit doel ontwikkelde apparatuur.

<sup>3</sup> Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

<sup>4</sup> Toepassing met behulp van “onkruidbestrijkers”, mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipt en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt.

<sup>5</sup> Toepassen tussen de rijen met hand gedragen spuit met afschermkap.

### **Overige toepassingsvoorwaarden**

Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen en gesloten verhardingen.

Behandeld gras niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.

Voor zilte teelten (lamsoor, zeekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van kerstbomen en volveldstoepassing uit fytosanitaire overweging op aanwijzing van de directeur van NPPO van NVWA, of rechtsopvolger, uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT 90.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen, is toepassing in de teelt van boomgaarden (zwartstroken) uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek voor neerwaartse onkruidbestrijding in fruitteelt en boomteelt.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is plekgewijze bespuiting uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een handgedragen/handgetrokken spuitboom met minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen of een afschermkap.

Let op: In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.

Let op: In de teelt van kerstbomen het middel in november toepassen op gewas dat tenminste 2 jaar is.

