

1 november 2023

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Winterkoolzaad (onbedekte teelt)	Grondbehandeling voor opkomst	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1
Zomerkoolzaad (onbedekte teelt)	Grondbehandeling voor zaaien	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1
Koolgewassen (onbedekte teelt)	Inwerken kort voor het planten	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Aardbei (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,0 L/ha	2 per teeltcyclus	7	-
Bessen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Druif (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,75 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Braam- en framboos- achtigen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt)	Na zaaien, voor opkomst (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,22 - 1,84 L/ha**	1 per teeltcyclus	-	62
Raapstelen (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Veldsla (onbedekte teelt)	Na zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,22 - 1,84 L/ha**	1 per teeltcyclus	-	-
Rucola (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,6 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Baby leaves (onbedekte teelt)	Na zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,22 - 1,84 L/ha**	1 per teeltcyclus	-	28
Boon met peul (onbedekte teelt)	Voor opkomst (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en	1,6 L/ha	1 per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
		eenjarige breedbladige onkruiden				
Radijs-achtigen (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Knolraap (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Koolraap (onbedekte teelt)	Voor zaaien (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	0,85 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)	Na zaaien, voor opkomst (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	1,22 - 1,84 L/ha**	1 per teeltcyclus	-	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
		breedbladige onkruiden				
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Na zaaien, voor opkomst (grondbehandeling)	Eenjarige grasachtige en eenjarige breedbladige onkruiden	2,7 L/ha	1 per 12 maanden	-	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

**afhankelijk van de weersomstandigheden: 1,22 L/ha bij koud weer, anders 1,84 L/ha.

Overige toepassingsvoorwaarden

Schudden voor gebruik.

In de onbedekte teelt van koolgewassen, boon met peul, knol- en koolraap, spinazie-achtigen, raapstelen, radijsachtigen, veldsla, rucola, baby leaves, aromatische kruidgewassen en bloemenzaad het middel toepassen in 150-600 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van koolzaad het middel toepassen in 150-400 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van steenvruchten, aardbei, bessen, druif en braam- en framboos-achtigen het middel toepassen in 150-800 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van bloembollen- en bloemknollen (m.u.v. tulp en lelie), bolbloemen en knolbloemen, bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen en vaste planten het middel toepassen in 300-800 liter water per ha.

In verband met residuen in volg- of vervanggewassen mogen in de eerstvolgende 180 dagen na toepassing van het middel geen voeder-/voedselgewassen anders dan de toegelaten gewassen worden geteeld. Voorafgaand aan het zaaien/planten van een vervanggewas mag het middel niet nogmaals toegepast worden.

Om zoogdieren te beschermen mag dit product, in de teelt van bessen, braam-en framboos-achtigen, alleen worden toegepast, indien er geen permanente grasstroken aanwezig zijn tussen de teeltrijen.

In verband met de lange nawerking van het middel in de bodem moet rekening worden gehouden met kans op schade aan volg- of vervanggewassen.

Als de teelt mislukt kunnen koolsoorten of koolzaad als vervanggewas veilig geteeld worden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen napropamide. Napropamide behoort tot de acetamiden. De HRAC code is ø (onbekend werkingsmechanisme). Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.