

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	8 per teeltcyclus	8 l/ha per teeltcyclus	7
			1-1,5 l/ha	8 per teeltcyclus		
			2-2,5 l/ha	4 per teeltcyclus		
	Rijenbehandeling na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25-0,37 l/ha ¹	8 per teeltcyclus		
			0,5-0,75 l/ha	8 per teeltcyclus		
			1-1,25 l/ha	8 per teeltcyclus		
Aardbei (onbedekte teelt)	Voor bloei, na oogst of na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	4-8 l/ha	2 per 12 maanden	8 l/ha per 12 maanden	10

¹ in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Russische paardenbloem	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	6 per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	7	-
			1-1,5 l/ha	6 per 12 maanden			
			2-2,5 l/ha	3 per 12 maanden			
Aardbei (onbedekte teelt)	Voor bloei, na oogst of na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-3 l/ha	12 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	5	-
Spinazie (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	2 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	5	28

Snijbiet (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	2 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	5	28
Knolraap (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	6 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	7	60
			1-1,5 l/ha	6 per teeltcyclus		10	
			2-2,5 l/ha	3 per teeltcyclus			
Koolraap (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	6 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	7	60
			1-1,5 l/ha	6 per teeltcyclus		10	
			2-2,5 l/ha	3 per teeltcyclus			
Rode biet (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	6 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	7	-
			1-1,5 l/ha	6 per teeltcyclus			
			2-2,5 l/ha	3 per teeltcyclus			
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	6 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	7	60
			1-1,5 l/ha	6 per teeltcyclus		10	
			2-2,5 l/ha	3 per teeltcyclus			
Mierikswortel (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	6 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	7	60
			1-1,5 l/ha	6 per teeltcyclus		10	
			2-2,5 l/ha	3 per teeltcyclus			

Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	6 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	7	-
			1-1,5 l/ha	6 per teeltcyclus			
			2-2,5 l/ha	3 per teeltcyclus			
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-0,75 l/ha ¹	6 per teeltcyclus	6 l/ha per teeltcyclus	7	-
			1-1,5 l/ha	6 per teeltcyclus			
			2-2,5 l/ha	3 per teeltcyclus			
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-3 l/ha	6 per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	5	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	6 per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	12	-
Vaste planten (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	6 per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	12	-

Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 l/ha	6 per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	12	-
---	------------	----------------------------------	----------	------------------	-----------------------	----	---

¹ in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

Toepassingsvoorwaarden

In de onbedekte teelt van aardbei maximaal 8 l/ha per 12 maanden toepassen.

Bij het gebruik in bieten, het middel toepassen voor het sluiten van het gewas.

In de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen (m.u.v. lelie en tulp) en in de onbedekte teelt van bolbloemen en knolbloemen het middel toepassen in 200 tot 400 liter water per ha.

Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Dit middel bevat de werkzame stof fenmedifam. Fenmedifam behoort tot de fenylcarbamaten. De Hrac code is C1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.