

20 augustus 2025

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Appel (onbedekte teelt)	Schurft ^{1,2} , Echte meeldauw ³	0,01% (10 gram per 100 liter water)	0,15 kg/ha	3	0,45 kg/ha	7	14
Peer (onbedekte teelt)	Schurft ^{1,2} , Echte meeldauw ³	0,01% (10 gram per 100 liter water)	0,15 kg/ha	3	0,45 kg/ha	7	14
Aardbei (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ⁴	0,125 kg/ha	0,125 kg/ha	2	0,25 kg/ha	7	3
Aardbei (bedekte teelt)	Echte meeldauw ⁴	0,0125% (12,5 gram per 100 liter water)	0,15 kg/ha	2	0,3 kg/ha	7	3
Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)	Vuur ⁵	0,25 kg/ha	0,25 kg/ha	3	0,75 kg/ha	7	-
Bolbloemen en knolbloemen m.u.v. lelie (bedekte teelt)	Vuur ⁵	0,25 kg/ha	0,25 kg/ha	3	0,75 kg/ha	7	-
Lelie (bedekte teelt)	Vuur ⁵	0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	3	1,2 kg/ha	7	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Bloemisterijgewassen	Echte meeldauw ⁶ , Roest ⁷	0,0125% (12,5 gram per 100 liter water)	0,125 kg/ha	3	0,375 kg/ha	7	-
Boomkwekerijgewassen	Echte meeldauw ^{6,8}	0,0125% (12,5 gram per 100 liter water)	0,125 kg/ha	3	0,375 kg/ha	7	-
Vaste plantenteelt	Echte meeldauw ^{6,8}	0,0125% (12,5 gram per 100 liter water)	0,125 kg/ha	3	0,375 kg/ha	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Schurft (*Venturia inaequalis*)

² Schurft (*Venturia pyrina*)

³ Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

⁴ Echte meeldauw (*Sphaerotheca macularis*/ *Podosphaera macularis*)

⁵ Vuur (*Botrytis* spp.)

⁶ Echte meeldauw (*Sphaerotheca* spp.)

⁷ Roest (*Puccinia* spp.)

⁸ Echte meeldauw (*Oidium* spp.)

Het gebruik in de teelt van mispel en kweeper is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Pitvruchten m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt)	Schurft ¹ , Echte meeldauw ³	0,01% (10 gram per 100 liter water)	0,15 kg/ha	3	0,45 kg/ha	7	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Schurft (*Venturia inaequalis*)

³ Echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van pitvruchten (appel, peer, mispel en kweeper) uitsluitend opwaarts toepassen met machinaal voortbewogen apparatuur.

Draag beschermende handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van pitvruchten (appel, peer, mispel en kweeper) op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien:

voor 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

vanaf 1 mei en indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5 of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van bloembollen en bloemknollen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan, indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van aardbeien, bloemisterijgewassen, neerwaarts gespoten boomkwekerijgewassen en vaste planten op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij/bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van hoge laanbomen (>5 meter) op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van boomkwekerijgewassen (spillen) op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, is toepassing in de teelt van van boomkwekerijgewassen (opzetters) uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 500 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof trifloxystrobin. Trifloxystrobin behoort tot de Quinone outside Inhibitors (QoI-fungiciden). De Frac code is 11. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen