

Actueel WG van het middel Dagonis, 15862 N

10 juli 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

W9

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Gewasbehandeling	Alternaria ¹	0,75 L/ha	4 per teeltcyclus	3,0 L/ha per teeltcyclus	7	3
Sla; <i>Lactuca</i> spp. (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Sclerotiënrot ³	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	2,0 L/ha per 12 maanden	-	14
Erwt met peul (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ⁴	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	2,0 L/ha per 12 maanden	-	7
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ⁴	2,0 L/ha	1 per 12 maanden	2,0 L/ha per 12 maanden	-	7
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁵ Mycosphaerella ⁶	0,6 L/ha	3 per 12 maanden	1,8 L/ha per 12 maanden	7	3

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> niet- eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁵ Mycosphaerella ⁶	0,6 L/ha	3 per teeltcyclus	1,8 L/ha per teeltcyclus	7	3
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> niet- eetbare schil (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁵ Mycosphaerella ⁶	0,6 L/ha	3 per teeltcyclus	1,8 L/ha per teeltcyclus	21	3
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ⁷	0,6 L/ha	2 per teeltcyclus	1,2 L/ha per teeltcyclus	7	3
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Ringvlekkenziekte ⁸ Spikkelziekte ⁹	1,0 L/ha	3 per teeltcyclus	3,0 L/ha per 12 maanden	21	14
Wortelen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁰	0,6 L/ha	2 per 12 maanden	2,0 L/ha per 12 maanden	7	7
		Zwarte- plekkenziekte ¹¹	1,0 L/ha	2 per 12 maanden		7	
		Sclerotiënrot ¹²	2,0 L/ha	1 per 12 maanden		-	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Alternaria (*Alternaria solani*, *Alternaria alternata*)

³ Sclerotiënrot (*Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*)

⁴ Bladvlekkenziekte (*Didymella pisi* / *Ascochyta pisi* , *Peyronellaea pinodes* / *Mycosphaerella pinodes*)

⁵ Echte meeldauw (*Sphaerotheca fuliginea* / *Podosphaera xanthii*, *Golovinomyces cichoracearum* / *Erysiphe cichoracearum*, *Leveillula taurica* / *Oidiopsis taurica*)

⁶ Mycosphaerella (*Mycosphaerella melonis* / *Didymella bryoniae*)

⁷ Echte meeldauw (*Leveillula taurica*, *Oidium neolycopersici*)

⁸ Ringvlekkenziekte (*Mycosphaerella brassicicola*)

⁹ Spikkelziekte (*Alternaria* spp.)

¹⁰ Echte meeldauw (*Leveillula* spp.)

¹¹ Zwarte-plekkenziekte (*Alternaria radicina*)

¹² Sclerotienrot (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Aardbei	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	7	1
Witlof (trekteelt)	Voor opslag Dompelbehandeling	Sclerotienrot ¹⁴ Wortelrot ¹⁵	2,5% (250 ml middel per 100 liter water)	100 ml per 1000 kg pennen	1	100 ml per 1000 kg pennen	-	21
	Voor opslag Pennenbehandeling	Sclerotienrot ¹⁴ Wortelrot ¹⁵	75-100 ml per 1000 kg pennen	100 ml per 1000 kg pennen				

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
	Na opslag Gewasbehandeling	Sclerotienrot ¹⁴ Wortelrot ¹⁵	15 ml/m ² teeltbed	15 ml/m ² teeltbed	1	15 ml/m ² teeltbed		
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Ringvlekkenziekte ⁸ Spikkelziekte ⁹	1,0 L/ha	1,0 L/ha	3	3,0 l/ha	21	14
Radijs-achtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7
		Alternaria ¹⁷	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7
		Alternaria ¹⁷	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Pastinaak (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7
		Alternaria ¹⁷	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Knolraap (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7
		Alternaria ¹⁷	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Koolraap (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
		Alternaria ¹⁷	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Aardpeer (onbedekte teelt)	Gewas behandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7
		Alternaria ¹⁷	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Knolselderij (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7
		Alternaria ¹⁷	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Schorseneer (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7
		Alternaria ¹⁷	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Mierikswortel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7
		Alternaria ¹⁷	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Bosuien (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Purpervlekken-ziekte ¹⁹ Roest ²⁰	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2	2,0 L/ha	7	14
Prei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Purpervlekken-ziekte ¹⁹ Roest ²⁰	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2	2,0 L/ha	7	14

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ³	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	14
Aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7
		Alternaria ¹⁷	1,0 L/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ³	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	14
Medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ¹⁶	0,6 L/ha	0,6 L/ha	2	2,0 L/ha	7	7
		Alternaria ¹⁷	1,0 l/ha	1,0 L/ha	2		7	
		Sclerotienrot ¹⁸	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1		-	
Gerbera (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²¹	1,0 L/ha	1,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
		Sclerotienrot ¹⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha				
Roos (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²²	1,0 L/ha	1,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
		Sclerotienrot ¹⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha				
Potplanten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Potplanten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
Snijbloemen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-
Snijbloemen (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ¹⁴ Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-
Snijbloemen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
Trekheesters (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-
Trekheesters (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Sclerotienrot ¹⁴ Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-
Trekheesters (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Snijgroen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-
Snijgroen (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Sclerotiënrot ¹⁴ Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-
Snijgroen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
Klimplanten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-
Sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-
Coniferen (incl. kerstbomen) (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-
Heide soorten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Vruchtbomen- en struiken (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-
Vaste plantenteelt (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-
Vaste plantenteelt (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	21	-
Bloemenzaadteelt	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
(bedekte, grond gebonden teelt)		Roesten ²⁴						
Bloemenzaadteelt (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw ²³ Roesten ²⁴	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Alternaria (*Alternaria solani*, *Alternaria alternata*)

² Echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*, *Podosphaera macularis* / *Sphaerotheca macularis*)

³ Sclerotienrot (*Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*)

⁸ Ringvlekkenziekte (*Mycosphaerella brassicicola*)

⁹ Spikkelziekte (*Alternaria* spp.)

¹⁴ Sclerotienrot (*Sclerotinia* spp.)

¹⁵ Wortelrot (*Thielaviopsis* spp.)

¹⁶ Echte meeldauw (*Erysiphe heraclei*, *Leveillula* spp.)

¹⁷ Alternaria (*Alternaria* spp.)

¹⁸ Sclerotienrot (*Sclerotinia sclerotiorum*)

¹⁹ Purpervlekkenziekte (*Alternaria porri*)

²⁰ Roest (*Puccinia allii*)

²¹ Echte meeldauw (*Podosphaera xanthii* / *Oidium citrulli*)

²² Echte meeldauw (*Podosphaera pannosa* / *Sphaerotheca pannosa*)

²³ Echte meeldauw (*Oidium* soorten, *Sphaerotheca* soorten, *Podosphaera* soorten, *Microsphaera* soorten, *Erysiphe* soorten)

²⁴ Roesten (*Puccinia* soorten, *Coleosporium* soorten, *Melampsora* soorten, *Uromyces* soorten, *Cronartium* soorten, *Phragmidium* soorten, *Gynosporangium* soorten)

Overige toepassingsvoorwaarden

Behandelde medicinale kruidgewassen alleen gebruiken voor homeopathische of medicinale doeleinden.

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan sierteeltgewassen (inclusief gerbera en roos).

In de teelt van witlof (trekteelt) dient de toepassing voor opslag uitsluitend machinaal plaats te vinden.

In de teelt van aardbei het middel toepassen vanaf stolon vorming (BBCH 40).

In de teelt van erwt met peul en erwt zonder peul het middel toepassen vanaf begin ontwikkeling van de bloeiwijze (BBCH 51).

In de teelt van vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met eetbare schil en vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met niet-eetbare schil het middel toepassen in 200 tot 1500 liter water per ha.

In de teelt van vruchtgroenten van *Solanaceae* het middel toepassen in 400 tot 1500 liter water per ha.

In de teelt van bosui en prei het middel toepassen in 200 tot 600 liter water per ha.

In de teelt van sierteeltgewassen (bedekte teelt) het middel toepassen in 500 tot 1500 liter water per ha.

Om zoogdieren te beschermen is toepassen in de teelten van sla uitsluitend toegestaan tot BBCH 39 (einde rozetvorming).

Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

In de bedekte teelt van vruchtgroente van *Cucurbitaceae* met eetbare en niet-eetbare schil en vruchtgroente van *Solanaceae* verdient het, in verband met kans op gewasschade, aanbeveling om in de winterperiode (oktober - maart) met een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas / cultivar geen schade ondervindt van een behandeling met het middel.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen difenoconazool en fluxapyroxad. Difenoconazool behoort tot de triazolen (DMI fungiciden). De Frac code is 3. Fluxapyroxad behoort tot de Succinate dehydrogenase remmers (SDHI). De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

