

3 september 2025

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Aardbei (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Trips, Rupsen2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	4 per 12 maanden	7	7
Sla (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	3 per 12 maanden	7	7
Sla (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	1,0 L/ha	3 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	10	7
Spinazie (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	3 per 12 maanden	7	7
Spinazie (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	1,0 L/ha	3 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	10	7
Courgette (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Courgette (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2, Trips	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	1,0 L/ha	5 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	7	3

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Komkommer (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Komkommer (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2, Trips	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	1,0 L/ha	5 per teeltcyclus, 15 per 12 maanden	7	3
Pompoen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Pompoen (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2, Trips	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	1,0 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Meloen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Meloen (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2, Trips	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	1,0 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Watermeloen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Watermeloen (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2, Trips	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	1,0 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Aubergine (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Trips, Tomaatmineermot1, Rupsen2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	1
Aubergine	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Trips,	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	1

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
(bedekte, grondgebonden teelt)	Tomaatmineermot1, Rupsen2	per 100 liter water)				
Tomaat (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Trips, Tomaatmineermot1, Rupsen2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Tomaat (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Trips, Tomaatmineermot1, Rupsen2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Paprika (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Trips, Tomaatmineermot1, Rupsen2	0,1 - 0,15 % (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Paprika (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Trips, Tomaatmineermot1, Rupsen2	0,1 - 0,15 % (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	5 per 12 maanden	7	3
Aromatische kruidgewassen muv thee Camillia sinensis (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	3 per 12 maanden	7	7
Aromatische kruidgewassen muv thee, Camellia sinensis (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen2	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	1,0 L/ha	3 per teeltcyclus, 6 per 12 maanden	10	7
Potplanten (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Dwergcicaden, Mineervlieg, Rupsen, Trips	0,1 - 0,12% (0,1 - 0,12 L middel per 100 liter water)	1,2 L/ha	5 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Dwergcicaden, Mineervlieg, Rupsen, Trips	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	5 per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Snijbloemen (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlies, Dwergcicaden, Mineervlies, Rupsen, Trips	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	1,0 L/ha	5 per teeltcyclus, 35 per 12 maanden	10	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlies, Dwergcicaden, Mineervlies, Rupsen2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	3 per 12 maanden	7	-
Veredelings-en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlies, Dwergcicaden, Mineervlies, Rupsen2	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	3 per 12 maanden	10	-
Veredelings-en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlies, Dwergcicaden, Mineervlies, Rupsen2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 L middel per 100 liter water)	1,5 L/ha	3 per 12 maanden	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

1 Tomaatmineermot (*Tuta absoluta*)

2 Uilenmot (*Noctuidae*)

Het gebruik in de teelt van Bloembollen en bloemknollen en Bolbloemen en knolbloemen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloembollen en bloemknollen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlug, Dwergcicaden, Mineervlieg, Rupsen, Trips	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	5 per 12 maanden	7
Bloembollen en bloemknollen (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlug, Dwergcicaden, Mineervlieg, Rupsen, Trips	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	5 per 12 maanden	10
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlug, Dwergcicaden, Mineervlieg, Rupsen, Trips	0,1% (0,1 L middel per 100 liter water)	0,9 L/ha	5 per 12 maanden	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van tomaat, aubergine, paprika, komkommer (niet grondgebonden) en courgette (niet grondgebonden) het middel toepassen in 1000-1500 liter water per ha.

In de teelt van bloembollen en bloemknollen, bolbloemen en knolbloemen, in de niet grondgebonden teelt van snijbloemen en in de grondgebonden verdelings- en zaadteelt het middel toepassen in 900 liter water per ha.

In alle andere teelten het middel toepassen in 1000 liter water per ha.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Het middel niet toepassen in walk-in tunnels.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Gevaarlijk voor bijen. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden

De gewasveiligheid van dit middel in de wintermaanden is voor de bedekte teelten niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat dit middel op grote schaal toegepast wordt.