

31 januari 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen (onbedekte teelt)	Doodspuiten; na de oogst, voor het planten of zaaien van het gewas	Onkruiden, graanopslag, dekvruchten en stoppels	0,75 - 1,5 kg/ha ¹	1,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-
Akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen, bosbouw (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken ³	Onkruiden, wilde biet en biet opslag	18% (180 g in 1 liter water)	0,15 kg/ha ²	1 per 12 maanden	-
	Pleksgewijs spuiten ⁴ / aanstrijken ³	Onkruiden	26% (260 g in 1 liter water)	0,15 kg/ha ²	1 per 12 maanden	-
Aardappelen	Behandeling na het poten, voor opkomst	Onkruiden en graanopslag	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Suikerbiet	Behandeling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden en graanopslag	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst, haver	Behandeling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden en graanopslag	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	1 per teeltcyclus	-

Peulvruchten	Behandeling na zaaien, voor opkomst	Onkruiden en graanopslag	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Cultuurgrasland	Behandeling over het onkruid, voor het zaaien van het gewas	Onkruiden en gras	0,75 - 1,5 kg/ha ¹	1,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-
Mosterd	Behandeling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden en graanopslag	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Lijnzaad, koolzaad	Behandeling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden en graanopslag	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Appel, peer (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op zwartstrook	0,75 kg/ha ²	1 per 12 maanden	-
Kers, pruim (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op zwartstrook	0,75 kg/ha ²	1 per 12 maanden	-
Wijndruif, ouder dan 4 jaar (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op zwartstrook	0,75 kg/ha ²	1 per 12 maanden	28
Koolraap, knolraap (onbedekte teelt)	Behandeling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Uien, bosuien (onbedekte teelt)	Behandeling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Asperge (onbedekte teelt)	Behandeling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden	0,75 - 2,5 kg/ha ¹	2,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-
Prei (onbedekte teelt)	Behandeling na het zaaien, voor opkomst	Onkruiden	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	1 per teeltcyclus	-
Bosbouw	Behandeling voor het planten of zaaien van het gewas	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹	1,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-
	Strokenbehandeling					
Tijdelijk onbeteeld terrein	Sputten over onkruiden	Onkruiden	0,75 - 1,5 kg/ha ¹	1,5 kg/ha	1 per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid.

² Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

³ Met behulp van “onkruidbestrijkers” mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipst en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt.

⁴ Met hand gedragen spuit met afschermkap.

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	Padenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op pad	0,75 kg/ha ²	1
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Padenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op pad	0,75 kg/ha ²	1
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Padenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op pad	0,75 kg/ha ²	1
Laanbomen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op zwartstrook	0,75 kg/ha ²	1
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op zwartstrook	0,75 kg/ha ²	1
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op zwartstrook	0,75 kg/ha ²	1
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op zwartstrook	0,75 kg/ha ²	1
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op zwartstrook	0,75 kg/ha ²	1

Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,0 - 1,5 kg/ha ¹ op zwartstrook	0,75 kg/ha ²	1
---	---------------------------------	-----------	--	-------------------------	---

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid.

² Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

⁵ Toepassen met afschermkap.

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 100-400 liter water per ha.

Voor zilte teelten (lamsoor, zeekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt binnen bassins.

Behandeld gras niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing bij pleksgewijze toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een handgedragen/handgetrokken spuitboom met minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen of een afschermkap.