

2 september 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van grondbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2, Ctgb juni 2019) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen)	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7
Bloemisterijgewassen	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7
Boomkwekerijgewassen	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7

Vaste plantenteelt	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7
Houtige beplanting	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7
Kruidachtige beplanting	menging door (pot)grond of compost tijdens het zaaien of (her)planten	kevers ¹	0,5 kg/m ³	2	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Gegroefde lapsnuitkever / taxuskever (*Otiorhynchus sulcatus*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Bevat *Metarhizium brunneum* stam Ma 43. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden bij gebruik in bedekte teelten. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.