

26 juli 2023

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Tomaat (bedekte teelt)	Mijten ¹	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)**	8 L/ha	5	7
	Wittevlieg ²			6	
Paprika (bedekte teelt)	Mijten ¹	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)**	8 L/ha	5	7
	Wittevlieg ²			6	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Dosering is afhankelijk van de plaagdruk

¹ Spintmijt (*Tetranychus urticae*)

² Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing**	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Witlof (pennenteelt) (bedekte teelt)	Bladluis Trips	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Cichorei (bedekte teelt)	Bladluis Trips	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Steenvruchten (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	8 L/ha	11	7	1
Aardbei (bedekte teelt)	Wittevlieg Bladluis Spintmijt Trips	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Bessen (bedekte teelt)	Wittevlieg Bladluis Spintmijt Trips	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Braam- en framboos-achtigen (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Kiwi (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1

Sla (<i>lactuca</i> spp.) (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Andijvie (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Spinazie-achtigen (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Peulgroenten (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Aubergine (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	8 L/ha	11	7	1
Tomatilo (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	8 L/ha	11	7	1
Okra (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	8 L/ha	11	7	1
Vruchtgroenten Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Vruchtgroenten Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Bloemkool (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg Trips	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1

Chinese kool (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg Trips	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Radijs-achtigen (bedekte teelt)	Spintmijt Wittevlieg Trips	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Wortelgewassen (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg Trips	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Bosuien (bedekte teelt)	Wittevlieg Trips	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Stengelgroenten (bedekte teelt)	Bladluis Wittevlieg Trips	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Kruidenteelt, vers en gedroogd (bedekte teelt)	Bladluis Spintmijt Wittevlieg Trips	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	1
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. tulp en lelie (bedekte teelt)	Bladluis Wittevlieg Trips	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	-
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. tulp en lelie (Dompelbehandeling, bedekte teelt)	Bollenmijt, Tulpengalmijt	0,8%	8 L/ha	1	-	-
Potplanten (bedekte teelt)	Wittevlieg Spintmijt	0,4%-0,8% (400-800 ml middel per	8 L/ha	11	7	-

		100 liter water)				
Snijbloemen (bedekte teelt)	Mijten ¹ , wittevlieg ^{2,3} , trips ^{4,5} , wolluis ⁶ , dopluis ^{7,8,9} , bladluis ^{10,11}	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	-
Trekheesters (bedekte teelt)	Mijten ¹ , wittevlieg ^{2,3} , trips ^{4,5} , wolluis ⁶ , dopluis ^{7,8,9} , bladluis ^{10,11}	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	-
Snijgroen (bedekte teelt)	Mijten ¹ , wittevlieg ^{2,3} , trips ^{4,5} , wolluis ⁶ , dopluis ^{7,8,9} , bladluis ^{10,11}	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Bladluis Wittevlieg Trips Spintmijt	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Bladluis Wittevlieg Trips Spintmijt	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	-
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Bladluis Wittevlieg Trips Spintmijt	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	-
Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt)	Bladluis Wittevlieg Trips Spintmijt	0,4%-0,8% (400- 800 ml middel per 100 liter water)	4 L/ha	20	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Dosering is afhankelijk van de plaagdruk

- 1 Spintmijt (*Tetranychus urticae*)
- 2 Kaswittevlies (*Trialeurodes vaporariorum*)
- 3 Tabakswittevlies (*Bemisia tabaci*)
- 4 Tabakstrips (*Thrips tabaci*)
- 5 Californisch trips (*Frankliniella occidentalis*)
- 6 Wolluis (*Phenacoccus avenae*)
- 7 Platte dopluis (*Coccus hesperidum*)
- 8 Halve dopluis (*Saissetia coffeae*)
- 9 Dopluis (*Parthenolecanium corni*)
- 10 Gele rozenluis (*Rhodobium porosum*)
- 11 Groene perzikbladluis (*Myzus persicae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Tegen bevriezing beschermen.

Continu roeren tijdens gebruik.

Gebruik een anti-schuim middel (concentratie 0.001%, e.g. dimethylsiloxaan) om schuimvorming te voorkomen.

In de bedekte teelt van tomaat, paprika, witlof (penneteelt), Cichorei, steenvruchten, aardbei, bessen, kiwi, druif, braam en framboos-achtigen, sla, andijvie, spinazie-achtigen, peulgroenten, aubergine, tomatilo, okra, vruchtgroenten van *Cucurbitaceae*, bloemkool, Chinese kool, wortelgewassen, bosuien, stengelgroenten, kruidenteelt vers en gedroogd, snijgroen, trekheesters, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt en veredelingsteelt en zaadteelt het middel toepassen in 200-1000 liter water per ha.

In de bedekte teelt van aardappel en radijs-achtigen het middel toepassen in 200-500 liter water per ha.

In de bedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen en snijbloemen het middel toepassen in 500-1000 liter water per ha.

In de teelt van potplanten het middel toepassen in 200-1200 liter water per ha.

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde steenvruchten, potplanten en bloembol- en bloemknolgewassen (na dompelbehandeling).

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden en bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden en bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden en bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.