

6 maart 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Bieten	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	2	10	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha		-		
Mais	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	4 l/ha	-
		Bermudagrass1 en kweek2	4 l/ha		-		

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Peulvruchten m.u.v. linzen	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Koolzaad	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Groenbemestergewassen m.u.v. grasachtige groenbemesters	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Druif (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	42
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Boon met peul (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	28

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Boon zonder peul (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	28
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Erwt met peul (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	35
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	35
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Sluitkool	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	28
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Spruitkool	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Bloemkool (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	28
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	42
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Wortelen (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	35
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Bosui (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	28

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Prei (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	42
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	tussen het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				
Houtige beplanting	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	-	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha				

¹Bermudagrass (*Cynodon dactylon*), ² Kweek (*Elytrigia repens*)

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Het gebruik in de teelt van teelt vezelvlas, lijnzaad, aardbei, sla (*Lactuca spp.*), spinazie, suikerwortel, pastinaak, knolraap, aardpeer, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel, medicinale wortelgewassen, zaadproductie van alfalfa /luzerne, klaver en zwenkgras en de veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Vezelvlas, lijnzaad	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Aardbei (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	42
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Sla (<i>Lactuca</i> spp.) (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	21
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Spinazie (onbedekte teelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	28
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Suikerwortel	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Pastinaak	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Knolraap	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Aardpeer	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Rode biet	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Knolselderij	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Schorseneer	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Mierikswortel	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Medicinale wortelgewassen	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	56
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Alfalfa/luzerne (zaadteelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Klaver (zaadteelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Zwenkgras (graszaadteelt)	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	5 l/ha	-
		Meerjarige grasachtige onkruiden	4-5 l/ha			
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.	tussen of over het gewas	Eenjarige grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1	2 l/ha	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van vezelvlas, aardbei, sla, spinazie, sluitkool, spruitkool, bloemkool, bladkoolachtigen, alfalfa/luzerne en klaver, het middel toepassen in 100-400 liter water per ha.

In de teelt van mais het middel toepassen in 150-300 liter water per ha.

In de overige gewassen het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Gebruik is uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

In de teelt van druiven het middel vóór vruchtzetting (BBCH 60) toepassen.

In de teelt van peulvruchten, boon met peul, boon zonder peul, erwt met peul en erwt zonder peul het middel vóór de bloei (BBCH 39) toepassen.

In de teelt van mais het middel na opkomst toepassen tot en met het 8e bladstadium (BBCH18).

Focus Plus is alleen geschikt voor maisrassen die tolerant zijn voor cycloxydim.

Na toepassing geldt een wachttijd van 4 weken voor de zaai van grassen (*Poaceae*).

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van sierteeltgewassen is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel wordt aangeraden om eerst een proefbespuiting uit te voeren om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof cycloxydim. Cycloxydim behoort tot de chemische groep cyclohexanedionen. De HRAC code is 1. Bij dit product bestaat er risico op ontwikkeling van resistentie. Omdat er bij deze groep kruisresistentie bestaat, dit middel afwisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.