

2 augustus 2023

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte ¹	0,4 L/ha	4	7 – 10 **	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** 10 dagen na een toepassing tijdens BBCH 10-39 (voor het sluiten van het gewas), 7 dagen na een toepassing tijdens BBCH ≥40.

¹ Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*).

Het gebruik in de teelt van aardbei is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (onbedekte vermeerderingsteelt)	Pestalotiopsis ²	0,2 L/ha	3	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

² Pestalotiopsis (*Pestalotiopsis longisetula*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Let op: De verpakking naspoelen met spuitvloeistof (water) bij het vullen van de tank.

In de teelt van aardappelen het middel toepassen in 200 - 400 liter water per ha.

In de vermeerderingsteelt van aardbei uitsluitend neerwaarts toepassen met een machinaal voortgetrokken veldspuit.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld aardbeigewas (onbedekte vermeerderingsteelt).

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassen in de teelt van aardappel en aardbei op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof fluazinam. Fluazinam behoort tot de dinitroanilinen. De FRAC code is 29. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen. In het kader van resistentiemanagement dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme.