Actueel WG van het middel FANDANGO, 12723 N **W.6**

3 december 2025

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe	Voetziekte[1], kafjesbruin[2], aarfusarium[3] *of*	1,5 l/ha	1	1,5 L/ha	-	35
	Bladvlekkenziekte[4], echte meeldauw[5], DTR[6], bruine roest[7], gele roest[8]	1,5 l/ha	2	3 l/ha	21	35
Wintergerst	Netvlekkenziekte[9], bladvlekkenziekte[10], dwergroest[11], echte meeldauw[5]	1,25 l/ha	2	2,5 l/ha	21	35
Triticale	Voetziekte[1], kafjesbruin[2], aarfusarium[3] *of*	1,5 l/ha	1	1,5 l/ha	-	35

	Bladvlekkenziekte[4], echte meeldauw[5], DTR[6], bruine roest[7], gele roest[8]	1,5 l/ha	2	3 L/ha	21	35
Zomertarwe	Voetziekte[1], kafjesbruin[2], aarfusarium[3] *of*	1,5 l/ha	1	1,5 L/ha	-	35
	Bladvlekkenziekte[4], echte meeldauw[5], DTR[6], bruine roest[7], gele roest[8]	1,5 l/ha	2	3 l/ha	21	35
Zomergerst	Netvlekkenziekte[9], bladvlekkenziekte[10], dwergroest[11], echte meeldauw[5]	1,25 l/ha	2	2,5 l/ha	21	35
Uien	Valse meeldauw[12], bladvlekkenziekte[13]	1-1,25 l/ha**	2	2,5 l/ha	5	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** De dosering is afhankelijk van ziektedruk en weersomstandigheden.

[1] Voetziekte (*Cercosporella herpotrichoides/Oculimacula yallundae*)

[2] Kafjesbruin (*Septoria nodorum/Parastagonospora nodorum)*

[3] Aarfusarium (*Fusarium* spp.)

[4] Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici/Zymoseptoria tritici)*

[5] Echte meeldauw (*Erysiphe graminis/Blumeria graminis)*

[6] DTR (*Pyrenophora tritici-repentis)*

[7] Bruine roest (*Puccinia recondita)*

[8] Gele roest (*Puccinia striiformis*)

[9] Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*)

[10] Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

[11] Dwergroest (*Puccinia hordei*)
[12] Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)
[13] Bladvlekkenziekte (*Botryotinia squamosa*)

Het gebruik in de onbedekte teelt van sjalotten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen waarop toegepast mag worden
Sjalotten	Valse meeldauw[12], bladvlekkenziekte [13]	1-1,25 l/ha**	2	2,5 l/ha	5	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
** De dosering is afhankelijk van ziektedruk en weersomstandigheden.
[12] Valse meeldauw (*Peronospora destructor)*
[13] Bladvlekkenziekte (*Botryotinia squamosa)*

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van sjalotten uitsluitend toepassen met machinaal voortbewogen apparatuur.

In de teelt van granen het middel toepassen vanaf tweede knoop ten minste 2 cm boven de eerste knoop (BBCH 32)

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van uien en sjalotten op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot), of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van 300 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van wintertarwe, triticale en zomertarwe, met een dosering van 2 x 1,5 L product/ha, op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van:
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 100 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van wintergerst en zomergerst op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van:
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 75 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot), of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van 250 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van wintertarwe, triticale en zomertarwe, met een dosering van 1 x 1,5 L product/ha, op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van:
- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 75 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot), of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van 200 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).

In verband met mogelijke gewasreactie dient overlap van spuitbanen te worden vermeden.

<u>Resistentiemanagement</u>
Dit middel bevat de werkzame stoffen prothioconazool en fluoxastrobine. Prothioconazool hoort tot de Demethylation inhibitors (DMI- fungiciden). De Frac code is 3. Fluoxastrobine hoort tot de Quinone outside inhibitors (QoI-fungicides). De Frac code is 11. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.