

6 november 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel, doodspuitmiddel en middel voor de behandeling van stobben voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Akkerbouwgewassen , bloembol- en bloemknolgewassen	Behandeling voor planten of zaaien	Dekvruchten	1,4-3,2 L/ha	3,2 L/ha	1 per 12 maanden	3,2 L/ha per 12 maanden	-	-
Akkerbouwgewassen Cultuurgrasland Fruitgewassen Groenteteelt m.u.v. asperge Kruidenteelt Sierteeltgewassen Bosbouw	Behandeling voor zaaien/planten of opkomst	Onkruiden	1,4-3,2 L/ha	3,2 L/ha	1 per 12 maanden	3,2 L/ha per 12 maanden	-	-

Grasvegetatie m.u.v. grasbermen (onbedekte teelt)								
Akkerbouwgewassen Cultuurgrasland Fruitgewassen Groenteteelt Kruidenteelt Sierteeltgewassen Bosbouw Grasvegetatie m.u.v. grasbermen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs spuiten ¹	Onkruiden	1,5% (150 ml in 10 liter water)	0,22 L/ha ³	1 per 12 maanden	0,22 L/ha per 12 maanden	-	60
Sierteeltgewassen Grasvegetatie m.u.v. grasbermen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken ²	Onkruiden	25% (500 ml in 1,5 liter water)	0,3 L/ha ³	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	-
Akkerbouwgewassen Cultuurgrasland Fruitgewassen Groenteteelt Kruidenteelt Sierteeltgewassen Grasvegetatie m.u.v. grasbermen (onbedekte teelt)	Behandeling over het gewas	Gewassen uit fytosanitaire overweging op aanwijzing van de directeur van NPPO van NVWA, of rechtsopvolger	2,1 L/ha	2,1 L/ha	2 per 12 maanden	4,3 L/ha per 12 maanden	28	-
	Pleksgewijs spuiten		1,5% (150 mL middel in 10 L water)	0,3 L/ha ³	2 per 12 maanden		28	-
Peulvruchten	Pleksgewijs spuiten, kort voor oogst	Onkruiden	1,4-3,6 L/ha	0,36 L/ha ³	1 per 12 maanden	0,36 L/ha per teeltcyclussen	-	7
Groenbemesters	Over het gewas	Groenbemesters en onkruiden	1,4-4,3 L/ha	4,3 L/ha	2 per 12 maanden	4,32 L/ha per	28	-

						teeltcyclu s		
Fruitgewassen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	3,75% (375 ml in 10 liter water)	1,5 L/ha ³	1 per 12 maanden	1,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Groot fruit (onbedekte teelt)	Strokenbehandelin g	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha op zwartstroo k	1 L/ha in de boomgaar d	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	28
Asperge (onbedekte teelt)	Behandeling voor opkomst	Onkruiden	1,4-3,2 L/ha	3,2 L/ha	2 per 12 maanden	3,2 L/ha per 12 maanden	28	-
Sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	3,75% (375 ml in 10 liter water)	1,5 L/ha ³	1 per 12 maanden	1,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Narcis (meerjarige, onbedekte teelt)	Behandeling na afsterven loof, voordat nieuwe uitloop begint	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha	2,1 L/ha	1 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	-	-
Kerstbomen (onbedekte teelt)	Behandeling over het gewas	Onkruiden, Amerikaanse vogelkers	1,4-2,1 L/ha	2,1 L/ha	1 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	-	-
Openbaar groen en particuliere tuinen (onbedekte teelt)	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	3,75% (375 mL middel in 10 L water)	1,5 L/ha ³	1 per 12 maanden	1,5 L/ha per 12 maanden	-	-
	Pleksgewijze injectie in de stengel	Holle stengel onkruiden zoals Japanse duizendknoop	20% (20 ml in 100 ml water), injectie van 5-10ml	3,6 L/ha	2 per 12 maanden	7,2 L/ha per 12 maanden	60	-

			oplossing per stengel					
Bosbouw	Pleksgewijs spuiten	Amerikaanse vogelkers ⁴	0,75% (75 mL in 10 L water)	0,3 L/ha ³	2 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	28	-
Onbeteeld terrein	Pleksgewijs aanstrijken	Stobben van bomen en struiken	3,75% (375 mL middel in 10 L water)	1,5 L/ha ³	1 per 12 maanden	1,5 L/ha per 12 maanden	-	-
Tijdelijk onbeteeld terrein m.u.v. akkerranden	Spuiten over het onkruid	Onkruiden	1,4-3,2 L/ha	3,2 L/ha	2 per 12 maanden	6,4 L/ha	28	-
Gesloten verhardingen (m.u.v. Maasstroomgebied)	Pleksgewijs spuiten	Onkruiden, houtige planten	1,5% (150 mL in 10 L water)	0,32 L/ha	2 per 12 maanden	0,32 L/ha per 12 maanden	30	-
Halfopen verhardingen (m.u.v. Maasstroomgebied)	Pleksgewijs spuiten	Onkruiden, houtige planten	1,5% (150 mL in 10 L water)	0,32 L/ha	2 per 12 maanden	0,32 L/ha per 12 maanden	30	-
Open verhardingen	Spuiten over het onkruid	Onkruiden, houtige planten	1,4-3,2 L/ha	3,2 L/ha	2 per 12 maanden	6,4 L/ha	28	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Toepassen tussen de rijen met afschermkap.

² Aanstrijken: met behulp van “onkruidbestrijkers”, mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenste gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipst en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt.

³ Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

⁴ Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*).

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclussen of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Zonnebloem (oliehoudende zaden)	Pleksgewijs spuiten, kort voor oogst	Onkruiden	1,4-4,3 L/ha	0,43 L/ha ³	1 per 12 maanden	0,43 L/ha per teeltcyclussen	-	7
Druif (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Onkruiden	1,4-2,1 l/ha op zwartstrook	1 L/ha in de boomgaard	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	28
Noten (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Onkruiden	1,4-2,1 l/ha op zwartstrook	1 L/ha in de boomgaard	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	28
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	Padenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha op pad	1 L/ha ³	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	-
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Padenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha op pad	1 L/ha ³	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Padenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha op pad	1 L/ha ³	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Laanbomen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	-
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	-
Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	-
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling ⁵	Onkruiden	1,4-2,1 L/ha op zwartstrook	1 L/ha ³	2 per 12 maanden	2,1 L/ha per 12 maanden	28	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

³ Dit is de totale dosering die per ha per toepassing toegepast mag worden.

⁵ Toepassen met afschermkap

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel als volveldsbespuiting toepassen in 200-400 L water per ha.

Voor zilte teelten (lamsoor, zeekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins.

Toepassing van dit middel op halfopen en gesloten verhardingen is uitsluitend toegestaan volgens de 'criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen' volgens de DOB- methode (Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen, zie www.dob-verhardingen.nl).

Om drinkwaterbronnen te beschermen is het toepassen van dit middel **niet toegelaten** op gesloten en half-open verhardingen in het **Maasstroomgebied**. Het betreft de volgende gebieden in Nederland:

- Provincie Limburg
- Provincie Noord-Brabant m.u.v. de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom
- De gemeenten:
 - Maasdriel
 - West Maas en Waal
 - Druten
 - Wijchen
 - Beuningen
 - Heumen
 - Nijmegen, ten westen van het Maas-Waalkanaal

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing met een handgedragen spuit (rugspuit) uitsluitend toegestaan met minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen of een afschermkap.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel in openbaar groen en particuliere tuinen (m.u.v. grasbermen, windsingels, en – schermen, en – hagen en overige houtige beplantingen), tijdelijk onbeteelde terreinen (m.u.v. akkerranden), en permanent onbeteelde terreinen (m.u.v. onverharde terreinen) uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT75.

In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.

In de teelt van kerstbomen het middel in november en december toepassen op gewas dat tenminste 2 jaar is.

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof glyfosaat. Glyfosaat behoort tot de chemische groep Glycine. De HRAC code 9 (Legacy G). Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.