

10 juni 2022

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 3 kg/ha ²	1	5 kg/ha	-
	rond opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 kg/ha ³	1		-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 – 2 kg/ha ⁴	6		5
Rode biet	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 – 3 kg/ha ²	1	5 kg/ha	-
	rond opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 kg/ha ³	1		-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 – 2 kg/ha ⁴	6		5

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	rond opkomst en na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 – 4 kg/ha ²	2	5 kg/ha	7
Lelies (onbedekte teelt)	rond opkomst en na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 – 4 kg/ha ²	2	5 kg/ha	7
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 kg/ha ⁵	10		7
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	rond opkomst of na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1 - 2 kg/ha ⁶	2	4 kg/ha	7

¹ Straatgras (*Poa annua*)

² Dosering afhankelijk van de grondsoort

³ In combinatie met 2 liter per ha minerale of plantaardige olie.

⁴ LDS in combinatie met olie.

⁵ LDS in combinatie met toegelaten middelen.

⁶ De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen.

Het gebruik in de onbedekte teelt van tagetes, aardbei, spinazie m.u.v. raapstelen, snijbiet, tuinmelde, knolraap, koolraap, knolselderij, mierikswortel, oregano voor etherische oliën, zomerbloemen, bloemisterijgewassen, sierheesters inclusief rozen, heide soorten, de vaste plantenteelt, de bloemenzaadteelt, en de veredelings- en zaadteelt is beoordeeld conform artikel 51 EG 1007/2009. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheid- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen
Tagetes (groenbemester)	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 – 2 kg/ha ²	5	5 kg/ha	7
Aardbei (onbedekte teelt)	na uitplanten	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 – 1 kg/ha	3	3 kg/ha	10
Spinazie m.u.v. raapstelen (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	4 kg/ha per 12 maanden	-
Snijbiet (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
Tuinmelde (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
Knolraap (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
Koolraap (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
Knolselderij (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
	na het planten	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1		-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen
Mierikswortel (onbedekte teelt)	na het planten	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-
Oregano voor etherische oliën (onbedekte teelt)	na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 - 2 kg/ha ²	3	5 kg/ha	10
Zomerbloemen (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	3 kg/ha ³	1	5 kg/ha	-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 kg/ha ³	9		7
Bloemisterijgewassen m.u.v. zomerbloemen (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	5 kg/ha	-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 kg/ha	9		7
Sierheesters inclusief rozen (onbedekte teelt)	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 – 1 kg/ha ²	3	3 kg/ha	10
Heide soorten (onbedekte teelt)	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 – 1 kg/ha ²	3	3 kg/ha	10
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 – 2 kg/ha	10	5 kg/ha	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	3 kg/ha ³	1	5 kg/ha	-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 kg/ha ³	9		7
Veredeling en groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5 - 2 kg/ha ²	1	2 kg/ha	-

¹ Straatgras (*Poa annua*)

² Dosering afhankelijk van de grondsoort.

³ Eventueel in combinatie met toegelaten middelen.

Toepassingsvoorwaarden

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en is Goltix WG toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:

- zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
- na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metamitron. Metamitron behoort tot de triazonen. De Hrac code is C1.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

