

31 december 2021

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Appel (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bewaarziekten ¹	0,04% (0,04 kg/100 Liter water)	0,45 kg/ha	2	7	3
Peer (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bewaarziekten ¹	0,04% (0,04 kg/100 Liter water)	0,45 kg/ha	2	7	3
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ²	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	3
Sla; <i>Lactuca</i> spp.	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7
Andijvie	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7
Veldsla	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Rucola	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7
Boon met peul (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	2	10	14
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,75 kg/ha	0,75 kg/ha	2	10	14
Aromatische kruidgewassen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ² Rattenkeutelziekte ³	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	10	7

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Bewaarziekten (*Botrytis cinerea*/*Botryotinia fuckeliana*, *Penicillium expansum*, *Monilia frutigena*, *Phlyctema vagabunda* (= *Gloeosporium*), *Nectria galligena*)

² Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

³ Rattenkeutelziekte (*Sclerotinia* spp.)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is op basis van een “derdenuitbreiding” en is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximale dosering middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassing en in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴ Vruchtrot ⁵	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,45 kg/ha	2	0,9 kg/ha	10	7
Aardbeien (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	3
Bessen m.u.v. moerbeï, rozembottel en kiwibes (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	7
Kiwibes (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	21	21
Druiven (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	21	21
Braam- en framboosachtigen (<i>Rubus</i> spp.)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximale dosering middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassing en in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Asperge (onbedekte teelt)	Dompelen voor planten	Fusarium ⁶	0,1% (0,1 kg/100 L water)	0,15 kg/ha	1	0,15 kg/ha	-	-
Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,4 kg/ha	2	0,8 kg/ha	10	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Potplanten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Potplanten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Snijbloemen (bedekte teelt, niet grondgebonden)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximale dosering middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Snijbloemen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Trekheesters (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Trekheesters (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Snijgroen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Snijgroen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Klimplanten (onbedekte teelt, neerwaarts gespoten)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Sierheesters (onbedekte teelt, neerwaarts gespoten)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximale dosering middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassing en in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt, neerwaarts gespoten)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,45 kg/ha	0,45 kg/ha	2	0,9 kg/ha	7	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,4 kg/ha	2	0,8 kg/ha	10	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	2	0,8 kg/ha	10	-
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,04% (0,04 kg/100 L water)	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-
Veredeling en groentenzaadteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ⁴	0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	10	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximale dosering middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassing en in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst (onbedekte teelt)								

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

⁴ Grauwe Schimmel (*Botrytis* spp.)

⁵ Vruchtrot (*Monilia* spp.)

⁶ Fusarium (*Fusarium oxysporum*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In appel, peer, steenvruchten en vruchtbomen en -struiken het middel toepassen in maximaal 1125 liter water per ha.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

De gewasveiligheid van het middel in de wintermaanden is voor de bedekte teelten van sla (*Lactuca spp.*), andijvie, veldsla en rucola niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat het middel in de bedekte teelt van deze gewassen op grote schaal toegepast wordt.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof fludioxonil. Fludioxonil behoort tot Phenylpyrrolen. De Frac code is 12. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.