

7 oktober 2022

Wettelijk Gberuiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Tomaat (bedekte teelt)	Grauwe schimmel ^{11, 14} Sclerotiënrot ¹⁵	0,5 kg/ha	8	7	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹¹ Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

¹⁴ Grauwe schimmel (*Botrytis* spp.)

¹⁵ Sclerotiënrot (*Sclerotinia* spp.)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardbei	Grauwe schimmel ¹¹	0,75 kg/ha	8	7	1
Sla; <i>Lactuca</i> spp.	Valse meeldauw ^{12, 13,}	0,75 kg/ha	8	7	1

	Grauwe schimmel ¹⁴				
Vruchtgroenten van <i>Curcubitaceae</i> eetbare schil	Echte meeldauw ^{1, 2, 3}	0,5 kg/ha	8	7	1
Vruchtgroenten van <i>Curcubitaceae</i> niet-eetbare schil	Echte meeldauw ^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}	0,5 kg/ha	8	7	1
Paprika (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁶	0,5 kg/ha	8	7	1
Aubergine	Grauwe schimmel ^{11, 14} , Sclerotienrot ¹⁵	0,5 kg/ha	8	7	1
Radijs (bedekte teelt)	Echte meeldauw ⁶	0,75 kg/ha	8	7	1
Potplanten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ¹⁶ Grauwe schimmel ¹¹	0,75 kg/ha	8	7	1
Snijbloemen (bedekte, grond gebonden teelt)	Echte meeldauw ¹⁶ Grauwe schimmel ¹¹	0,75 kg/ha	8	7	1
Snijbloemen (bedekte, niet-grond geboden teelt)	Echte meeldauw ¹⁶ Grauwe schimmel ¹¹	0,75 kg/ha	8	7	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)

² Echte meeldauw (*Podosphaera xanthii*)

³ Echte meeldauw (*Leveillula* spp.)

⁴ Echte meeldauw (*Uncinula* spp.)

⁵ Echte meeldauw (*Sphaerotheca* spp.)

⁶ Echte meeldauw (*Podosphaera* spp.)

⁷ Echte meeldauw (*Phyllactinia* spp.)

⁸ Echte meeldauw (*Oidium* spp.)

⁹ Echte meeldauw (*Microsphaera* spp.)

¹⁰ Echte meeldauw (*Golovinomyces* spp.)

¹¹ Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

¹² Valse meeldauw (*Bremia* spp.)

¹³ Valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

¹⁴ Grauwe schimmel (*Botrytis* spp.)

¹⁵ Sclerotiënrot (*Sclerotinia* spp.)

¹⁶ Echte meeldauw (*Erysiphe* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 100-1000 L water per ha.

Continu roeren tijdens toepassing.

De werking kan variabel zijn. Dit middel is gebaseerd op een micro-organisme en kan bijdragen aan de preventieve bestrijding van grauwe schimmel en sclerotiënrot.

“Bevat celwanden van *Saccharomyces cerevisiae*. Cerevisane kan mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken en kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademmoeilijkheden veroorzaken”.