

Actueel WG van het middel ASPERELLO T34 Biocontrol

**W.2**

22 januari 2021

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

| Toepassingsgebied                                                            | Type toepassing                        | Werkzaamheid<br>getoetst op | Dosering* middel<br>per toepassing                                            | Maximaal aantal<br>toepassingen per<br>teeltcyclus of per 12<br>maanden | Maximaal<br>aantal<br>kg middel<br>per ha per<br>teeltcyclus of<br>per<br>12 maanden | Minimum interval<br>tussen toepassingen<br>in dagen |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vruchtgroenten van<br>Cucurbitaceae eetbare schil<br>(bedekte teelt)         | Mengen door<br>teeltmedium             | Wortelrot <sup>1</sup>      | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                 | 1 per teeltcyclus                                                       | 5 kg/ha per<br>teeltcyclus                                                           | -                                                   |
|                                                                              | Bespuiting (zaadtrays<br>en multipots) |                             | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of<br>0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm<br>diepte) | 1 per teeltcyclus                                                       |                                                                                      | -                                                   |
|                                                                              | Druppelbehandeling of<br>aangieten     |                             | 10 g/m <sup>3</sup> substraat<br>65-200 g/1000<br>planten                     | 6 per teeltcyclus                                                       | 12<br>kg/teeltcyclus                                                                 | 30                                                  |
| Vruchtgroenten van<br>Cucurbitaceae niet-eetbare<br>schil<br>(bedekte teelt) | Mengen door<br>teeltmedium             | Wortelrot <sup>1</sup>      | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                 | 1 per teeltcyclus                                                       | 5 kg/ha per<br>teeltcyclus                                                           | -                                                   |
|                                                                              | Bespuiting (zaadtrays<br>en multipots) |                             | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of<br>0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm<br>diepte) | 1 per teeltcyclus                                                       |                                                                                      | -                                                   |
|                                                                              | Druppelbehandeling of<br>aangieten     |                             | 10 g/m <sup>3</sup> substraat<br>65-200 g/1000<br>planten                     | 6 per teeltcyclus                                                       | 12<br>kg/teeltcyclus                                                                 | 30                                                  |

| Toepassingsgebied                       | Type toepassing                              | Werkzaamheid<br>getoetst op | Dosering* middel<br>per toepassing                                                                                              | Maximaal aantal<br>toepassingen per<br>teeltcyclus of per 12<br>maanden | Maximaal<br>aantal<br>kg middel<br>per ha per<br>teeltcyclus of<br>per<br>12 maanden | Minimum interval<br>tussen toepassingen<br>in dagen |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vruchtgroenten van<br>Solanaceae        | Mengen door<br>teeltmedium                   | Wortelrot <sup>1</sup>      | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                                   | 1 per teeltcyclus                                                       | 5 kg/ha per<br>teeltcyclus                                                           | -                                                   |
|                                         | Bespuiting (zaadtrays<br>en multipots)       |                             | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of<br>0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm<br>diepte)                                                   | 1 per teeltcyclus                                                       |                                                                                      | -                                                   |
|                                         | Druppelbehandeling of<br>aangieten           |                             | 10 g/m <sup>3</sup> substraat<br>10-200 g/1000<br>planten                                                                       | 4 per teeltcyclus                                                       | 8 kg per<br>teeltcyclus                                                              | 30                                                  |
| Bloemisterijgewassen<br>(bedekte teelt) | Inmengen in het<br>substraat                 | Fusarium <sup>2</sup>       | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                                   | 1 per teeltcyclus                                                       | 5 kg/ha per<br>teeltcyclus                                                           | -                                                   |
|                                         | Bespuiting (zaadtrays<br>and multipots)      |                             | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of<br>0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm<br>diepte)                                                   | 1 per teeltcyclus                                                       |                                                                                      | -                                                   |
|                                         | Dompel<br>behandeling van<br>bewortelde stek |                             | Lange dip: 0,01 g/L<br>dompelvloeistof<br>(enkele uren of 's<br>nachts)<br><b>of</b><br>Korte dip: 0,1-1 g/L<br>dompelvloeistof | 1 per teeltcyclus                                                       |                                                                                      | -                                                   |
|                                         | Druppel<br>behandeling of<br>aangieten       |                             | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                                   | 6 per teeltcyclus                                                       | 19,8 kg/ha<br>per 12<br>maanden                                                      | 60                                                  |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Wortelrot (*Pythium* spp.)<sup>2</sup> Fusarium (*Fusarium* spp.)

Het gebruik in de bedekte teelt van kleinfruit, bladgroenten, vruchtgroenten van *Cucurbitacea* eetbare schil, vruchtgroenten van *Cucurbitacea* niet-eetbare schil, koolgewassen, kruidenteelt, bloembol- en bloemknolgewassen, snijbloemen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassingsgebied                         | Type toepassing                 | Werkzaamheid aannemelijk tegen                  | Dosering* middel per toepassing                                                                                               | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden    | Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kleinfruit m.u.v. aardbei (bedekte teelt) | Mengen door teeltmedium         | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                                 | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                           | Bespuiting (trays, multipots)   |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                           | Druppelbehandeling of aangieten |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat, eventueel gefractioneerd 2 x 5 g/m <sup>3</sup> (substraatteelt) of 2 x 2,5 kg/ha (vollegrond) | 1 per teeltcyclus (eventueel gefractioneerd in 2 per teeltcyclus) |                                                                    | 7                                             |
| Aardbei (bedekte teelt)                   | Mengen door teeltmedium         | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                                 | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                           | Bespuiting (trays, multipots)   |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |

| Toepassingsgebied              | Type toepassing                     | Werkzaamheid aannemelijk tegen                  | Dosering* middel per toepassing                                                                                               | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden    | Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                | Druppelbehandeling of aangieten     |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat, eventueel gefractioneerd 2 x 5 g/m <sup>3</sup>                                                | 1 per teeltcyclus (eventueel gefractioneerd in 2 per teeltcyclus) |                                                                    | 7                                             |
| Bladgroenten (bedekte teelt)   | Mengen door teeltmedium             | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                                 | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                | Bespuiting (zaadtrays en multipots) |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                | Druppelbehandeling of aangieten     |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat, eventueel gefractioneerd 2 x 5 g/m <sup>3</sup> (substraatteelt) of 2 x 2,5 kg/ha (vollegrond) | 1 per teeltcyclus (eventueel gefractioneerd in 2 per teeltcyclus) |                                                                    | 7                                             |
| Bonen met peul (bedekte teelt) | Mengen door teeltmedium             | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                                 | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                | Bespuiting (zaadtrays en multipots) |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                | Druppelbehandeling of aangieten     |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat, eventueel gefractioneerd 2 x 5 g/m <sup>3</sup> (substraatteelt) of                            | 1 per teeltcyclus (eventueel gefractioneerd in 2 per teeltcyclus) | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            | 7                                             |

| Toepassingsgebied                                                   | Type toepassing                     | Werkzaamheid aannemelijk tegen                  | Dosering* middel per toepassing                                                                                               | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden    | Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                     |                                     |                                                 | 2 x 2,5 kg/ha (vollegrond)                                                                                                    |                                                                   |                                                                    |                                               |
| Bonen zonder peul (bedekte teelt)                                   | Mengen door teeltmedium             | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                                 | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                                                     | Bespuiting (zaadtrays en multipots) |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                                                     | Druppelbehandeling of aangieten     |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat, eventueel gefractioneerd 2 x 5 g/m <sup>3</sup> (substraatteelt) of 2 x 2,5 kg/ha (vollegrond) | 1 per teeltcyclus (eventueel gefractioneerd in 2 per teeltcyclus) | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            | 7                                             |
| Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)      | Mengen door teeltmedium             | Fusarium <sup>2</sup>                           | 10 g/m <sup>3</sup>                                                                                                           | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                                                     | Bespuiting (zaadtrays en multipots) |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                                                     | Druppelbehandeling of aangieten     |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat 65-200 g/1000 planten                                                                           | 6 per teeltcyclus                                                 | 12 kg per teeltcyclus                                              | 30                                            |
| Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt) | Mengen door teeltmedium             | Fusarium <sup>2</sup>                           | 10 g/m <sup>3</sup>                                                                                                           | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                                                     | Bespuiting (zaadtrays en multipots) |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |

| Toepassingsgebied                                                   | Type toepassing                     | Werkzaamheid aannemelijk tegen                  | Dosering* middel per toepassing                                                | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden    | Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                     | Druppelbehandeling of aangieten     |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat<br>65-200 g/1000 planten                         | 6 per teeltcyclus                                                 | 12 kg per teeltcyclus                                              | 30                                            |
| Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)      | Gewasbehandeling                    | Didymella <sup>3</sup>                          | 1,2 kg/ha                                                                      | 6 per teeltcyclus                                                 | 7,2 kg/ha per teeltcyclus                                          | 7                                             |
| Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt) | Gewasbehandeling                    | Didymella <sup>3</sup>                          | 1,2 kg/ha                                                                      | 6 per teeltcyclus                                                 | 7,2 kg/ha per teeltcyclus                                          | 7                                             |
| Koolgewassen (bedekte opkweek)                                      | Mengen door teeltmedium             | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                  | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                                                     | Besputting (zaadtrays en multipots) |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)        | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                                                     | Druppelbehandeling of aangieten     |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat, eventueel gefractioneerd 2 x 5 g/m <sup>3</sup> | 1 per teeltcyclus (eventueel gefractioneerd in 2 per teeltcyclus) |                                                                    | 7                                             |
| Radijsachtigen (bedekte teelt)                                      | Mengen door teeltmedium             | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                  | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
| Stengelgroenten (bedekte teelt)                                     | Mengen door teeltmedium             | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                  | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                                                     | Besputting (zaadtrays en multipots) |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)        | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |

| Toepassingsgebied                              | Type toepassing                     | Werkzaamheid aannemelijk tegen                  | Dosering* middel per toepassing                                                                                     | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden    | Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                | Druppelbehandeling of aangieten     |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat, (eventueel gefractioneerd 2 x 5 g/m <sup>3</sup> )                                   | 1 per teeltcyclus (eventueel gefractioneerd in 2 per teeltcyclus) | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            | 7                                             |
| Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)  | Mengen door teeltmedium             | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                                | Bespuiting (zaadtrays en multipots) |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                             | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                                | Druppelbehandeling of aangieten     |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat, eventueel gefractioneerd 2 x 5 g/m <sup>3</sup>                                      | 1 per teeltcyclus (eventueel gefractioneerd in 2 per teeltcyclus) |                                                                    | 7                                             |
| Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt) | Mengen door teeltmedium             | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                                | Bespuiting (zaadtrays en multipots) |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                             | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                                | Dompel behandeling van knol of bol  |                                                 | Lange dip: 0,01 g/L dompelvloeistof (enkele uren of 's nachts)<br><b>of</b><br>Korte dip: 0,1-1 g/L dompelvloeistof | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                                | Druppelbehandeling of aangieten     |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                       | 6 per teeltcyclus                                                 | 19,8 kg/ha per 12 maanden                                          | 60                                            |

| Toepassingsgebied            | Type toepassing                        | Werkzaamheid aannemelijk tegen | Dosering* middel per toepassing                                                                                     | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Snijbloemen (bedekte teelt)  | Mengen door teeltmedium                | Wortelrot <sup>1</sup>         | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                       | 1 per teeltcyclus                                              | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                              | Bespuiting (zaadtrays en multipots)    |                                | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                             | 1 per teeltcyclus                                              |                                                                    |                                               |
|                              | Dompel behandeling van bewortelde stek |                                | Lange dip: 0,01 g/L dompelvloeistof (enkele uren of 's nachts)<br><b>of</b><br>Korte dip: 0,1-1 g/L dompelvloeistof | 1 per teeltcyclus                                              |                                                                    |                                               |
|                              | Druppelbehandeling of aangieten        |                                | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 1-3 kg/ha (vollegrond)                                                             | 6 per teeltcyclus                                              | 19,8 kg/ha per 12 maanden                                          | 60                                            |
| Trekheesters (bedekte teelt) | Mengen door teeltmedium                | Wortelrot <sup>1</sup>         | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                       | 1 per teeltcyclus                                              | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                              | Bespuiting (zaadtrays en multipots)    |                                | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                             | 1 per teeltcyclus                                              |                                                                    |                                               |
|                              | Dompel behandeling van wortels         |                                | 0,01 g/L dompelvloeistof                                                                                            | 1 per teeltcyclus                                              |                                                                    |                                               |
|                              | Druppelbehandeling of aangieten        |                                | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                       | 6 per teeltcyclus (afhankelijk van de potgrootte)              | 19,8 kg/ha per 12 maanden                                          | 60                                            |
| Snijgroen (bedekte teelt)    | Mengen door teeltmedium                | Wortelrot <sup>1</sup>         | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                       | 1 per teeltcyclus                                              | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |

| Toepassingsgebied                    | Type toepassing                        | Werkzaamheid aannemelijk tegen                  | Dosering* middel per toepassing                                                                                     | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                      | Bespuiting (zaadtrays en multipots)    |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                             | 1 per teeltcyclus                                              |                                                                    |                                               |
|                                      | Dompel behandeling van wortels         |                                                 | 0,01 g/L dompelvloeistof                                                                                            | 1 per teeltcyclus                                              |                                                                    |                                               |
|                                      | Druppelbehandeling of aangieten        |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                       | 6 per teeltcyclus (afhankelijk van de potgrootte)              | 19,8 kg/ha per 12 maanden                                          | 60                                            |
| Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) | Mengen door teeltmedium                | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                       | 1 per teeltcyclus                                              | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |
|                                      | Bespuiting (trays en multipots)        |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                             | 1 per teeltcyclus                                              |                                                                    |                                               |
|                                      | Dompel behandeling van bewortelde stek |                                                 | Lange dip: 0,01 g/L dompelvloeistof (enkele uren of 's nachts)<br><b>of</b><br>Korte dip: 0,1-1 g/L dompelvloeistof | 1 per teeltcyclus                                              |                                                                    |                                               |
|                                      | Druppelbehandeling of aangieten        |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 1-3 kg/ha (vollegrond)                                                             | 6 per teeltcyclus                                              | 19,8 kg/ha per 12 maanden                                          | 60                                            |
| Vaste plantenteelt (bedekte opkweek) | Mengen door teeltmedium                | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                       | 1 per teeltcyclus                                              | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            |                                               |

| Toepassingsgebied                                                                                                              | Type toepassing                        | Werkzaamheid aannemelijk tegen                  | Dosering* middel per toepassing                                                                                               | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden    | Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                | Bespuiting (trays & multipots)         |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                                                                                                                | Dompel behandeling van bewortelde stek |                                                 | Lange dip: 0,01 g/L dompelvloeistof (enkele uren of 's nachts)<br><b>of</b><br>Korte dip: 0,1-1 g/L dompelvloeistof           | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                                                                                                                | Druppelbehandeling of aangieten        |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                                 | 6 per teeltcyclus                                                 | 19,8 kg/ha per 12 maanden                                          | 60                                            |
| Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt) | Mengen door teeltmedium                | Wortelrot <sup>1</sup><br>Fusarium <sup>2</sup> | 10 g/m <sup>3</sup> substraat                                                                                                 | 1 per teeltcyclus                                                 | 5 kg/ha                                                            |                                               |
|                                                                                                                                | Bespuiting (zaadtrays en multipots)    |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat of 0,5 g/m <sup>2</sup> (bij 5 cm diepte)                                                       | 1 per teeltcyclus                                                 |                                                                    |                                               |
|                                                                                                                                | Druppelbehandeling of aangieten        |                                                 | 10 g/m <sup>3</sup> substraat, eventueel gefractioneerd 2 x 5 g/m <sup>3</sup> (substraatteelt) of 2 x 2,5 kg/ha (vollegrond) | 1 per teeltcyclus (eventueel gefractioneerd in 2 per teeltcyclus) | 5 kg/ha per teeltcyclus                                            | 7                                             |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup> Wortelrot (*Pythium* spp.)

<sup>2</sup> Fusarium (*Fusarium* spp.)

<sup>3</sup> *Didymella* (*Mycosphaerella* of *Didymella bryoniae*/ *Stagonosporopsis cucurbitacearum*)

**Overige toepassingsvoorwaarden**

Voeg het middel toe aan een kleine hoeveelheid water en meng goed. Voeg deze suspensie in de tank toe aan het totale benodigde volume water.

Het middel bij voorkeur opslaan in een droge, koele en vorstvrije plaats bij 4°C, bij deze temperatuur is het product 2 jaar houdbaar.

De spuitvloeistof dient continu geroerd te worden.

Let op: De toepassingsmethodes zijn niet allemaal afzonderlijk getoetst. De werkzaamheid van een toepassingschema dat de verschillende methodes combineert is aangetoond.

Draag een geschikte adembescherming tijdens het mengen/laden van het middel.

Bevat *Trichoderma asperellum* strain T34. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

**Gewasgevoeligheid**

Let op: De veiligheid van het middel is gedemonstreerd op een beperkt aantal sierteeltsoorten en variëteiten. Hoewel schade aan andere soorten en variëteiten hoogstwaarschijnlijk niet zal voorkomen bij normaal gebruik, is het toch aan te raden om het product te testen op een klein aantal planten alvorens een groot aantal planten van een nieuwe variëteit te behandelen voor de eerste keer.