

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegeestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Voor opkomst <i>of</i>	Kamille ¹	2 - 3 l/ha	1 per teeltcyclus	3 l/ha per teeltcyclus	-
	1) Voor opkomst	Kamille ¹	2 l/ha	1 per teeltcyclus	5 l/ha per teeltcyclus	14 (tussen voor opkomst en na opkomst toepassing)
	2) Na opkomst <i>of</i>	Eénjarige onkruiden	0,5 – 0,75 l/ha ⁹	6 per teeltcyclus		5
	Na opkomst <i>of</i>	Straatgras ² , Melganzevoet ³ , Paarse dovenetel ⁴ , Vogelmuur ⁵	1,7-2 l/ha ⁶	2 per teeltcyclus	4 l/ha per teeltcyclus	7
			1,5 l/ha ⁷	2 per teeltcyclus		10

		Eénjarige onkruiden	3 l/ha ⁸	1 per teeltcyclus		-
	Na opkomst	Eénjarige onkruiden	0,5 - 1 l/ha ⁹	8 per teeltcyclus	5 l/ha per teeltcyclus	5
Rode biet	Voor opkomst <i>of</i>	Kamille ¹	2 - 3 l/ha	1 per teeltcyclus	3 l/ha per teeltcyclus	-
	1) Voor opkomst en 2) Na opkomst <i>of</i>	Kamille ¹	2 l/ha	1 per teeltcyclus	5 l/ha per teeltcyclus	14 (tussen voor opkomst en na opkomst toepassing)
		Eénjarige onkruiden	0,5 – 0,75 l/ha ⁹	6 per teeltcyclus		5
	Na opkomst	Eénjarige onkruiden	1,5 l/ha ⁷	2 per teeltcyclus	5 l/ha per teeltcyclus	10
			0,5 - 1 l/ha ⁹	8 per teeltcyclus		5
Bloembol- en bloemknolgewass en m.u.v. lelie (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eénjarige onkruiden	3 l/ha	1 per teeltcyclus	3 l/ha per teeltcyclus	-
Lelie (onbedekte teelt)	Rond opkomst <i>of</i>	Eénjarige onkruiden	2 - 3 l/ha	1 per teeltcyclus	3 l/ha per teeltcyclus	-
	1) Rond opkomst en	Eénjarige onkruiden	2 l/ha	1 per teeltcyclus	5 l/ha per teeltcyclus	14 (tussen rond opkomst en na opkomst toepassing)
			0,5 l/ha ⁹	6 per teeltcyclus		7

	2) Na opkomst <i>of</i>					
	Na opkomst	Eénjarige onkruiden	0,5 l/ha ⁹	10 per teeltcyclus	5 l/ha per teeltcyclus	7
Lelie (bedekte teelt)	Rond opkomst	Eénjarige onkruiden	20 ml/are	2 per 12 maanden	40 ml/are per 12 maanden	7

¹ Kamille (*Chamomilla vulgaris*)

² Straatgras (*Poa annua*)

³ Melganzevoet (*Chenopodium album*)

⁴ Paarse dovenetel (*Lamium purpureum*)

⁵ Vogelmuur (*Stellaria media*)

⁶ In combinatie met 1,7-2 l/ha olie

⁷ In combinatie met 3 l/ha fenmedifam (160 g/l)

⁸ In combinatie met 5 l/ha olie

⁹ In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in de onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Tagetes	Na opkomst	Eénjarige onkruiden	1-2 l/ha	2 per teeltcyclus	4 l/ha per teeltcyclus	7

Aardbei uitgangsmateriaal (onbedekte teelt)	Na het uitplanten	Eénjarige onkruiden	0,5-1 l/ha	3 per teeltcyclus	2 l/ha per teeltcyclus	10
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	Rond opkomst <i>of</i>	Eénjarige onkruiden	2-3 l/ha	1 per teeltcyclus	3 l/ha per teeltcyclus	-
	1) Rond opkomst en 2) Na opkomst <i>of</i>	Eénjarige onkruiden	2 l/ha	1 per teeltcyclus	5 l/ha per teeltcyclus	14 (tussen rond opkomst en na opkomst toepassing)
			0,5 l/ha ⁹	6 per teeltcyclus		7
	Na opkomst	Eénjarige onkruiden	0,5 l/ha ⁹	10 per teeltcyclus	5 l/ha per teeltcyclus	7
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	Rond opkomst <i>of</i>	Eénjarige onkruiden	2-3 l/ha	1 per teeltcyclus	3 l/ha per teeltcyclus	-
	1) Rond opkomst en 2) Na opkomst <i>of</i>	Eénjarige onkruiden	2 l/ha	1 per teeltcyclus	5 l/ha per teeltcyclus	14 (tussen rond opkomst en na opkomst toepassing)
			0,5 l/ha ⁹	6 per teeltcyclus		
	Na opkomst	Eénjarige onkruiden	0,5 l/ha ⁹	10 per teeltcyclus	5 l/ha per teeltcyclus	7

Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	Rond opkomst	Eénjarige onkruiden	20 ml/are	2 per 12 maanden	40 ml/are per 12 maanden	7
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Voor opkomst <i>of</i>	Eénjarige onkruiden	3 l/ha	1 per 12 maanden	3 l/ha per 12 maanden	-
	Na opkomst <i>of</i>		3 L/ha	1 per 12 maanden	4 l/ha per 12 maanden	-
			1-2 l/ha	4 per 12 maanden		7
	Na opkomst		0,5-1 l/ha ⁹	8 per 12 maanden	5 l/ha per 12 maanden	5
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Na opkomst <i>of</i>	Eénjarige onkruiden	3 l/ha	1 per 12 maanden	4 l/ha per 12 maanden	-
			1-2 l/ha	4 per 12 maanden		7
	Na opkomst		0,5-1 l/ha ⁹	8 per 12 maanden	5 l/ha per 12 maanden	5
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Voor opkomst <i>of</i>	Eénjarige onkruiden	3 l/ha	1 per 12 maanden	3 l/ha per 12 maanden	-
	Na opkomst <i>of</i>		3 L/ha	1 per 12 maanden	4 l/ha per 12 maanden	-
			1-2 l/ha	4 per 12 maanden		7
	Na opkomst		0,5-1 l/ha ⁹	8 per 12 maanden	5 l/ha per 12 maanden	5

⁹ In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

Toepassingsvoorwaarden

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handsprit.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

In de onbedekte teelt van aardbei, bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp, bolbloemen en knolbloemen, bloemenzaad, bloemisterijgewassen en vaste planten het middel toepassen in 200-500 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp en bolbloemen en knolbloemen maximaal 5 L/ha middel per 12 maanden toepassen.

Bietenblad mag na dunnen of in geval van een mislukt bietengewas binnen een periode van 60 dagen na toepassing niet vervoerd worden.

Op humeuze grondsoorten en zwaardere gronden (vanaf 20% afslibbaar) kan de werking van de voor opkomst toepassing tegenvallen.

Indien in bloembol- en bloemknolgewassen nog geen ervaring is opgedaan met toepassing van Bettix SC in een bepaald ras, wordt aangeraden om eerst een proefbehandeling uit te voeren om de werkzaamheid en verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Nateelt

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook, dan kunnen na een toepassing van Bettix SC zonder grondbewerking weer bieten of rode biet worden ingezaaid. Mais en aardappelen kunnen worden geteeld nadat de grond is geploegd.

Voor rode biet geldt dat bij toepassing in een teelt waarbij in hetzelfde kalenderjaar nog een volgteelt wordt geteeld, uitsluitend een eenmalige bespuiting met Bettix SC uitgevoerd mag worden: of voor de opkomst of na de opkomst van het gewas.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metamitron. Metamitron behoort tot de triazinonen, de de Hrac code is C1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.