

2 december 2022

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Druif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	4	0	1

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld door de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea* / *Botryotinia fuckeliana*).

Het gebruik in de teelt van aardbei, bessen en braam- en framboos-achtigen (*Rubus* spp.) is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er zijn voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
-------------------	-----------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--	--------------------------------

Aardbei	Rijenbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	1
Bessen	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	1
Braam- en framboos-achtigen (<i>Rubus</i> spp.)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	1

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea* / *Botryotinia fuckeliana*).

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door Glastuinbouw Nederland. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardbei, opweek en vermeerderingsteelt	Rijenbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
	Gewasbehandeling					
Bessen, opweek en vermeerderingsteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Druif, opweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	4	0	-
Braam- en framboos-achtigen (<i>Rubus</i> spp.),	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-

opkweek en vermeerderingsteelt						
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil, opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Vruchtgroenten van Solanaceae, Opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Vruchtgroenten van cucurbitaceae eetbare schil	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	1
Vruchtgroenten van solanaceae	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	1
Bloemisterijgewassen, opkweek en vermeerderingsteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Potplanten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-

Snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Snijbloemen (bedekte teelt, niet grondgebonden)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Boomkwekerijgewassen, opkweek en vermeerderingsteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Klimplanten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-

Heide soorten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Vaste plantenteelt, opkweek en vermeerderingsteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Vaste plantenteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Bloemenzaadteelt	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappelen, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	1 kg/ha	6	0	-

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹Grauwe schimmel (*Botrytis cinerea* / *Botryotinia fuckeliana*).

Overige toepassingsvoorwaarden

De spuitvloeistof roeren tijdens toepassing.

Bevat *Aureobasidium pullulans* strains DSM 14940 and DSM 14941: Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

In de teelt van druiven het middel preventief toepassen vanaf het moment dat 80% van bloemkapjes (calyptra) zijn afgevallen (BBCH 68) tot de druiven rijp zijn voor oogst (BBCH 89).

De werkzaamheid kan onvoldoende zijn.