

Actueel WG van het middel PROBLAD, 16572 N

19 juli 2023

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is toegelaten als fungicide voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ^{2,3,4}	3,2 L/ha	6	8
Druif (onbedekte teelt)	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ⁵	3,2 L/ha	6	7
Tomaat (bedekte teelt)	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ^{6,7,8}	3,2 L/ha	6	7
Aubergine (bedekte teelt)	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ^{6,9}	3,2 L/ha	6	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

² echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

³ echte meeldauw (*Oidium* spp.)

⁴ echte meeldauw (*Erysiphe* spp.)

⁵ echte meeldauw (*Erysiphe necator*)

⁶ echte meeldauw (*Oidium neolycopersici*)

⁷ echte meeldauw (*Podosphaera* spp.)

⁸ echte meeldauw (*Leveillula* spp.)

⁹ echte meeldauw (*Leveillula Taurica*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Droog te oogsten erwten	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ⁴	3,2 L/ha	6	8
Droog te oogsten bonen	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ⁴	3,2 L/ha	6	8
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Monilia ¹⁰ , echte meeldauw ^{7,11}	3,2 L/ha	3	7
Noten (onbedekte teelt)	Monilia ¹⁰ , echte meeldauw ^{7,11}	3,2 L/ha	3	7
Kiwi (onbedekte teelt)	Monilia ¹⁰ , echte meeldauw ^{7,11}	3,2 L/ha	3	7
Boon met peul	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ⁴	3,2 L/ha	6	8
Boon zonder peul (onbedekte teelt)	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ⁴	3,2 L/ha	6	8
Erwt met peul	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ⁴	3,2 L/ha	6	8
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ⁴	3,2 L/ha	6	8
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ^{4, 11}	3,2 L/ha	6	7

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ^{4, 11}	3,2 L/ha	6	7
Chinees kool (bedekte teelt)	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ^{12,13}	3,2 L/ha	6	8
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)	grauwe schimmel ¹ , echte meeldauw ⁴	3,2 L/ha	6	8

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

⁴ echte meeldauw (*Erysiphe* spp.)

⁷ echte meeldauw (*Podosphaera* spp.)

⁸ echte meeldauw (*Leveillula* spp.)

¹⁰ Monilia (*Monilinia* spp.)

¹¹ echte meeldauw (*Sphaerotheca* spp.)

¹² echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*)

¹³ echte meeldauw (*Erysiphe betae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardbei, peulvruchten, peulgroenten, Chinese kool, en kruidenteelt het middel toepassen in 450 tot 1000 L water per ha.

In de teelt van druif het middel toepassen in 200 tot 1000 L water per ha.

In de teelt van tomaat, aubergine, vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* het middel toepassen in 200 tot 1500 L water per ha.

In de teelt van steenvruchten, noten, kiwi het middel toepassen in 1000 tot 1500 L water per ha.

Om schuimvorming te beperken tijdens het bereiden van de spuitoplossing:

Zorg er vóór gebruik voor dat alle toepassingsapparatuur schoon is. Voeg de helft van de benodigde hoeveelheid water toe en begin met roeren. Schud de container en giet de benodigde hoeveelheid PROBLAD® in de spuittank. Vul de tank tot het vereiste volume terwijl u roert. Er moet continu worden geroerd totdat het spuiten is voltooid. Direct na het mengen gebruiken; laat het spuitmengsel niet een nacht staan. Het wordt aanbevolen om water te gebruiken met een pH hoger dan 6 voor het toepassen van PROBLAD® in een spuittank.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.